



BQS-Bundesauswertung 2008 Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie

MediClin Herzzentrum Lahr/Baden

Teilnehmende Krankenhäuser (Bundesdaten): 78
Anzahl Datensätze Gesamt: 7.705
Datensatzversion: HCH 2008 11.0
Datenbankstand: 15. März 2009
2008 - D7858-L58366-P26771

Einleitung

Sie erhalten hiermit die Auswertungen der in Ihrem Krankenhaus durchgeführten und dokumentierten Datensätze in der Herzchirurgie. Bitte beachten Sie, dass aus datenschutzrechtlichen Gründen eine Auswertung nur erstellt wird, wenn mindestens 4 Fälle in die jeweilige Auswertung einbezogen werden konnten.

In die Qualitätssicherung Herzchirurgie sind für das Erfassungsjahr 2008 erstmals auch Daten von Patienten mit einem kathetergestützten Aortenklappeneingriff eingegangen. Die Auswertungen der Isolierten Aortenklappenchirurgie wurden in zwei getrennten Versionen für die konventionell chirurgischen und die kathetergestützten Eingriffe dargestellt.

Die Auswertung der Daten erfolgte somit für die drei Leistungsbereiche

1. Isolierte Koronarchirurgie
2. Isolierte Aortenklappenchirurgie
 - Teil A: Konventionell chirurgisch
 - Teil B: Kathetergestützt
3. Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie

Darüber hinaus dokumentierte sonstige Operationen wurden aus den jeweiligen Grundgesamtheiten ausgeschlossen, um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse gewährleisten zu können. Dadurch können sich Differenzen zwischen der Anzahl der an die BQS übermittelten und der Anzahl der ausgewerteten Datensätze ergeben.

Die Darstellung der Ergebnisse zur In-Hospital-Letalität in den Leistungsbereichen Isolierte Koronarchirurgie, Isolierte Aortenklappenchirurgie und Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie erfolgt für das Erfassungsjahr 2008 in risikoadjustierter Form anhand der von der BQS und der Fachgruppe Herzchirurgie gemeinsam entwickelten logistischen Regressionsmodelle KCH-Score, AKL-Score und KBA-Score. Der seit 2004 existierende KCH-Score wurde erneut angepasst und der AKL-Score sowie der KBA-Score komplett neu entwickelt. Eingehende Informationen zu den Risikoscores finden sich im Anhang zur Auswertung.

Zur Validierung der Auswertung erfolgte ein mehrstufiges Prüfverfahren bei der BQS und in der Fachgruppe Herzchirurgie. Wurde dennoch abschließend Korrekturbedarf in der Auswertung entdeckt, sind diese in dem Erratum festgehalten. Falls in der Ihnen vorliegenden Auswertung trotz aller Prüfungen noch unerkannte Fehler bestehen sollten, bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen.

Mitglieder der Fachgruppe Herzchirurgie:

Name	Benannt durch
Dr. Andreas Beckmann Duisburg, Berlin	Deutsche Krankenhausgesellschaft
PD Dr. Horst Laube Berlin	Bundesärztekammer
Prof. Dr. Knut-H. Leitz Bremen	Bundesärztekammer
Sabine Pfeffer Stuttgart	Deutscher Pflegerat
Horst Schmidt Oberursel	Spitzenverbände der Krankenkassen / Verband der privaten Krankenversicherung
Dr. Ernst Spitzenfeil Erlangen	Spitzenverbände der Krankenkassen / Verband der privaten Krankenversicherung
Prof. Dr. Ulrike Toellner-Bauer Dortmund	Deutscher Pflegerat
Dr. Marius Torka Weimar	Deutsche Krankenhausgesellschaft
Prof. Dr. Armin Welz Bonn	Deutsche Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie
Rainer Zurkowsky Düsseldorf	Patientenvertreter

Die Fachgruppe wurde von Herrn Prof. Dr. Jan **Gummert**, Bad Oeynhausen und Herrn Dr. Wolfgang **Schiller**, Bonn als sachverständige Gäste unterstützt.

Von Seiten der BQS wurde die Fachgruppe Herzchirurgie betreut durch die Projektleiter

Dr. med. Frank Thölen, Dipl.-Kauffrau Elke Schäfer und Dipl.-Stat. Joachim Kötting.

BQS-Bundesauswertung 2008 Kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie

Qualitätsindikatoren

MediClin Herzzentrum Lahr/Baden

Teilnehmende Krankenhäuser (Bundesdaten): 78
Anzahl Datensätze Gesamt: 7.705
Datensatzversion: HCH 2008 11.0
Datenbankstand: 15. März 2009
2008 - D7858-L58366-P26771

Übersicht Qualitätsindikatoren

	Fälle Krankenhaus	Fälle Gesamt
Anzahl Operationen an den Koronarien und der Aortenklappe	236	7.706
Anzahl Patienten, die in ihrer ersten Operation an den Koronarien und an der Aortenklappe operiert wurden.	236	7.700

Qualitätsindikator	Fälle Krankenhaus	Ergebnis Krankenhaus	Ergebnis Gesamt	Referenzbereich	Seite
QI 1: Postoperative Mediastinitis bei Patienten mit elektiver oder dringlicher Operationsindikation ohne präoperative Mediastinitis bzw. Wundinfektion des Thorax	1 / 221	0,5%	0,5%	nicht definiert	1.1
bei Patienten mit Risikoklasse 0 oder Risikoklasse 1	1 / 159	0,6%	0,4%	<= 2,5%	1.4
QI 2: Postoperative Nierenfunktionsstörung	16 / 118	13,6%	7,3%	<= 16,7%	1.7
QI 3: Neurologische Komplikationen	3 / 220	1,4%	1,7%	<= 5,2%	1.10

Übersicht Qualitätsindikatoren (Fortsetzung)

Qualitätsindikator	Fälle Krankenhaus	Ergebnis Krankenhaus	Ergebnis Gesamt	Referenz- bereich	Seite
QI 4: Letalität					
In-Hospital-Letalität bei allen Patienten, die in ihrer ersten Operation koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden	11 / 236	4,7%	5,8%	nicht definiert	1.13
In-Hospital-Letalität bei Patienten mit elektiver oder dringlicher Operations- indikation	9 / 221	4,1%	5,0%	nicht definiert	1.13
Verhältnis der beobachteten In-Hospital-Letalität zur erwarteten In-Hospital-Letalität nach logistischem KBA-SCORE		0,65	1,00	nicht definiert	1.18
Risikoadjustierte In-Hospital-Letalität nach logistischem KBA-SCORE		3,7%	5,7%	<= 11,2%	1.18
30-Tage-Letalität: Follow-up-Rate	236 / 236	100,0%	76,1%	nicht definiert	1.21
30-Tage-Letalität in Krankenhäusern mit einer Follow-up-Rate >= 97%	12 / 236	5,1%	5,7%	nicht definiert	1.22
30-Tage-Letalität in Krankenhäusern mit einer Follow-up-Rate >= 97% bei Patienten mit vollständiger Dokumentation zum EuroSCORE	12 / 236	5,1%	5,7%	nicht definiert	1.24

Qualitätsindikator 1: Postoperative Mediastinitis

Qualitätsziel:	Seltenes Auftreten einer postoperativen Mediastinitis
Grundgesamtheit:	Alle Patienten, die in ihrer ersten Operation koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden (siehe Zeilenbeschriftung)
Kennzahl-ID:	2008/HCH-KOMB/80265
Referenzbereich:	Ein Referenzbereich ist für diese Qualitätskennzahl derzeit nicht definiert.

Grundgesamtheit	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Alle Patienten, die in ihrer ersten Operation koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden	1 / 236	0,4%	38 / 7.700	0,5%
und mit OP-Dringlichkeit elektiv/dringlich ohne Mediastinitis und Wundinfektion des Thorax vor OP	1 / 221	0,5%	38 / 7.365	0,5%
Vertrauensbereich		0,0% - 2,6%		0,4% - 0,7%
Referenzbereich		nicht definiert		nicht definiert
und Body-Mass-Index BMI ¹ > 31	0 / 52	0,0%	11 / 1.589	0,7%
insulinpflichtigem Diabetes	0 / 31	0,0%	8 / 992	0,8%
mit Voroperation an Herz/Aorta	1 / 41	2,4%	2 / 508	0,4%
Kreatininwert >= 1,8 mg/dl bzw. 159 µmol/l vor OP	0 / 12	0,0%	1 / 358	0,3%
postoperativer Reanimation	0 / 7	0,0%	6 / 256	2,3%
COPD mit Dauermedikation	0 / 11	0,0%	3 / 582	0,5%

¹ gültige Angaben zu Größe und Gewicht liegen vor

Vorjahresdaten	Krankenhaus 2007		Gesamt 2007	
	Postoperative Mediastinitis		Postoperative Mediastinitis	
Grundgesamtheit	Anzahl	%	Anzahl	%
Alle Patienten, die in ihrer ersten Operation koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden	1 / 207	0,5%	55 / 7.689	0,7%
und mit OP-Dringlichkeit elektiv/dringlich ohne Mediastinitis und Wundinfektion des Thorax vor OP Vertrauensbereich	1 / 197	0,5% 0,0% - 2,9%	52 / 7.346	0,7% 0,5% - 0,9%

Postoperative Mediastinitis: Stratifizierung mit Risikoklassen nach NNIS¹

Risikofaktor		Risikopunkt
ASA	ASA \geq 3	1
OP- Dauer	OP-Dauer > 75%-Perzentil der OP-Dauer-Verteilung in der Grundgesamtheit hier: > 260 min	1
Wundkontaminations- klassifikation	Kontaminierter oder septischer Eingriff	1

Risikoklassen	
0	Patienten mit 0 Risikopunkten
1	Patienten mit 1 Risikopunkt
2	Patienten mit 2 Risikopunkten
3	Patienten mit 3 Risikopunkten

Grundgesamtheit: Alle Patienten, die in ihrer ersten Operation koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden

Risikoklassen	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Risikoklasse 0	6 / 236	2,5%	1.078 / 7.700	14,0%
Risikoklasse 1	153 / 236	64,8%	4.993 / 7.700	64,8%
Risikoklasse 2	73 / 236	30,9%	1.618 / 7.700	21,0%
Risikoklasse 3	4 / 236	1,7%	11 / 7.700	0,1%
unbestimmte Risikoklasse	0 / 236	0,0%	0 / 7.700	0,0%

¹ National Nosocomial Infections Surveillance of the Centers for Disease Control
Referenz: Culver et al: Surgical Wound Infection Rates By Wound Class,
Operative Procedure, and Patient Risk Index
Am J Med 91:152 (1991)

Risikoadjustierte postoperative Mediastinitis

Qualitätsziel: Seltenes Auftreten einer postoperativen Mediastinitis (Risikoklassen)

Grundgesamtheit: Alle Patienten, die in ihrer ersten Operation koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden, aufgeteilt nach Risikoklassen (siehe Zeilenbeschriftung)

Kennzahl-ID: 2008/HCH-KOMB/80266

Referenzbereich: <= 2,5% (Toleranzbereich; 95%-Perzentil)

Grundgesamtheit	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008	
	Postoperative Mediastinitis		Postoperative Mediastinitis	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Alle Patienten, die in ihrer ersten Operation koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden				
und Risikoklasse 0 oder Risikoklasse 1	1 / 159	0,6%	24 / 6.071	0,4%
Vertrauensbereich		0,0% - 3,6%		0,3% - 0,6%
Referenzbereich		<= 2,5%		<= 2,5%
Risikoklasse 0	0 / 6	0,0%	5 / 1.078	0,5%
Risikoklasse 1	1 / 153	0,7%	19 / 4.993	0,4%
Risikoklasse 2	0 / 73	0,0%	14 / 1.618	0,9%
Risikoklasse 3	0 / 4	0,0%	0 / 11	0,0%

Vorjahresdaten	Krankenhaus 2007		Gesamt 2007	
	Postoperative Mediastinitis		Postoperative Mediastinitis	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Alle Patienten, die in ihrer ersten Operation koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden				
und Risikoklasse 0 oder Risikoklasse 1	1 / 171	0,6%	44 / 6.065	0,7%
Vertrauensbereich		0,0% - 3,3%		0,5% - 1,0%


Verteilung der Krankenhausergebnisse [Diagramm 1a, Kennzahl-ID 2008/HCH-KOMB/80265]:

Anteil von Patienten mit postoperativer Mediastinitis an allen Patienten, die in ihrer ersten Operation elektiv oder dringlich koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden und ohne präoperative Mediastinitis bzw. Wundinfektion des Thorax


Krankenhäuser mit mindestens 20 Fällen in dieser Grundgesamtheit:

Minimum - Maximum der Krankenhausergebnisse: 0,0% - 4,0%

Median der Krankenhausergebnisse: 0,0%



Krankenhäuser




77 Krankenhäuser haben mindestens 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit. Das ausgewertete Krankenhaus ist farblich hervorgehoben.

Krankenhäuser mit weniger als 20 Fällen in dieser Grundgesamtheit:

Minimum - Maximum der Krankenhausergebnisse: 0,0% - 0,0%

Median der Krankenhausergebnisse: 0,0%



Krankenhäuser

1 Krankenhaus hat weniger als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit. Das ausgewertete Krankenhaus hat mindestens 20 Fälle und wird daher nicht dargestellt.
 0 Krankenhäuser haben keinen Fall in dieser Grundgesamtheit.


Verteilung der Krankenhausergebnisse [Diagramm 1b, Kennzahl-ID 2008/HCH-KOMB/80266]:

Anteil von Patienten mit postoperativer Mediastinitis an allen Patienten, die in ihrer ersten Operation koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden und mit Risikoklasse 0 oder Risikoklasse 1


Krankenhäuser mit mindestens 20 Fällen in dieser Grundgesamtheit:

Minimum - Maximum der Krankenhausergebnisse: 0,0% - 2,8%

Median der Krankenhausergebnisse: 0,0%



Krankenhäuser




%

73 Krankenhäuser haben mindestens 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit. Das ausgewertete Krankenhaus ist farblich hervorgehoben.

Krankenhäuser mit weniger als 20 Fällen in dieser Grundgesamtheit:

Minimum - Maximum der Krankenhausergebnisse: 0,0% - 0,0%

Median der Krankenhausergebnisse: 0,0%



Krankenhäuser

5 Krankenhäuser haben weniger als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit. Das ausgewertete Krankenhaus hat mindestens 20 Fälle und wird daher nicht dargestellt.
 0 Krankenhäuser haben keinen Fall in dieser Grundgesamtheit.

Qualitätsindikator 2: Postoperative Nierenfunktionsstörung

Qualitätsziel:	Seltenes Auftreten einer postoperativen Nierenfunktionsstörung
Grundgesamtheit:	Alle Patienten ohne präoperative Nierenersatztherapie mit einer präoperativen glomerulären Filtrationsrate (GFR) > 60 ml/min/1,73m ² , die in ihrer ersten Operation elektiv oder dringlich koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden und mit einer gültigen Angabe zum prä- und postoperativen Kreatininwert
Kennzahl-ID:	2008/HCH-KOMB/89923
Referenzbereich:	<= 16,7% (Toleranzbereich; 95%-Perzentil)

Modifizierte RIFLE-Klassifikation	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008	
	Anzahl	%	Anzahl	%
ohne Beeinträchtigung: ohne erhöhtes Risiko, ohne Nierenschädigung und ohne Nierenversagen	79 / 118	66,9%	3.302 / 4.241	77,9%
erhöhtes Risiko (Risk): Kreatininwert i. S. post- zu präoperativ 1,5- bis 2-fach erhöht oder GFR postoperativ um 25 - 50% vermindert	23 / 118	19,5%	628 / 4.241	14,8%
Nierenschädigung (Injury): Kreatininwert i. S. post- zu präoperativ 2- bis 3-fach erhöht oder GFR postoperativ um 50 - 75% vermindert	11 / 118	9,3%	129 / 4.241	3,0%
Nierenversagen (Failure): postoperativ akute Nierenersatztherapie oder Kreatininwert i. S. (postoperativ) >= 4 mg/dl oder Kreatininwert i. S. postoperativ mehr als 3-fach erhöht oder GFR postoperativ um mehr als 75% vermindert (Failure)	5 / 118	4,2%	175 / 4.241	4,1%
postoperativ chronische Nierenersatztherapie (Loss)	0 / 118	0,0%	7 / 4.241	0,2%
Nierenschädigung (Injury) oder Nierenversagen (Failure oder Loss)	16 / 118	13,6%	311 / 4.241	7,3%
Vertrauensbereich		7,9% - 21,1%		6,6% - 8,2%
Referenzbereich		<= 16,7%		<= 16,7%

Vorjahresdaten	Krankenhaus 2007		Gesamt 2007	
Modifizierte RIFLE-Klassifikation	Anzahl	%	Anzahl	%
Nierenschädigung (Injury) oder Nierenversagen (Failure oder Loss) Vertrauensbereich	5 / 108	4,6% 1,5% - 10,6%	294 / 4.122	7,1% 6,4% - 8,0%


Verteilung der Krankenhausergebnisse [Diagramm 2, Kennzahl-ID 2008/HCH-KOMB/89923]:

Anteil von Patienten mit modifizierter RIFLE-Klassifikation „Injury“, „Failure“ oder „Loss“ an allen Patienten ohne präoperative Nierenersatztherapie mit einer präoperativen glomerulären Filtrationsrate (GFR) > 60 ml/min/1,73m², die in ihrer ersten Operation elektiv oder dringlich koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden


Krankenhäuser mit mindestens 20 Fällen in dieser Grundgesamtheit:

Minimum - Maximum der Krankenhausergebnisse: 0,0% - 25,0%

Median der Krankenhausergebnisse: 6,5%



Krankenhäuser




71 Krankenhäuser haben mindestens 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit. Das ausgewertete Krankenhaus ist farblich hervorgehoben.

Krankenhäuser mit weniger als 20 Fällen in dieser Grundgesamtheit:

Minimum - Maximum der Krankenhausergebnisse: 0,0% - 17,6%

Median der Krankenhausergebnisse: 7,7%



Krankenhäuser

7 Krankenhäuser haben weniger als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit. Das ausgewertete Krankenhaus hat mindestens 20 Fälle und wird daher nicht dargestellt.
 0 Krankenhäuser haben keinen Fall in dieser Grundgesamtheit.

Qualitätsindikator 3: Neurologische Komplikationen

Qualitätsziel: Seltenes Auftreten einer postoperativen zerebrovaskulären Komplikation (TIA, Schlaganfall oder Koma)

Grundgesamtheit: Alle Patienten, die in ihrer ersten Operation koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden (siehe Zeilenbeschriftung)

Kennzahl-ID: 2008/HCH-KOMB/82340

Referenzbereich: <= 5,2% (Toleranzbereich; 95%-Perzentil)

Grundgesamtheit	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Alle Patienten, die in ihrer ersten Operation koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden	3 / 236	1,3%	153 / 7.700	2,0%
und mit OP-Dringlichkeit elektiv/dringlich und ohne neurologische Erkrankung des ZNS bzw. nicht nachweisbare präoperativen neurologischen Defizit (Rankin 0)	3 / 220	1,4%	116 / 6.954	1,7%
Vertrauensbereich		0,3% - 4,0%		1,4% - 2,0%
Referenzbereich		<= 5,2%		<= 5,2%
und Alter >= 70 Jahre	3 / 166	1,8%	94 / 5.161	1,8%
IABP ¹ -Einsatz	0 / 1	0,0%	0 / 25	0,0%
schlechte LVEF ² (< 30%)	0 / 2	0,0%	10 / 440	2,3%
ACI-Stenose	2 / 48	4,2%	27 / 921	2,9%

¹ intraaortale Ballonpumpe

² linksventrikuläre Ejektionsfraktion

Vorjahresdaten	Krankenhaus 2007		Gesamt 2007	
	Zerebrovaskuläres Ereignis mit einer Dauer von mehr als 24 Stunden und funktionell relevantem neurologischen Defizit bei Entlassung (Rankin >= 2)		Zerebrovaskuläres Ereignis mit einer Dauer von mehr als 24 Stunden und funktionell relevantem neurologischen Defizit bei Entlassung (Rankin >= 2)	
Grundgesamtheit	Anzahl	%	Anzahl	%
Alle Patienten, die in ihrer ersten Operation koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden	1 / 207	0,5%	174 / 7.689	2,3%
und mit OP-Dringlichkeit elektiv/dringlich und ohne neurologische Erkrankung des ZNS bzw. nicht nachweisbarem präoperativen neurologischen Defizit (Rankin 0) Vertrauensbereich	1 / 192	0,5% 0,0% - 2,9%	142 / 6.962	2,0% 1,7% - 2,4%


Verteilung der Krankenhausergebnisse [Diagramm 3, Kennzahl-ID 2008/HCH-KOMB/82340]:

Anteil von Patienten mit postoperativem zerebrovaskulären Ereignis mit einer Dauer von > 24 h und funktionell relevantem neurologischen Defizit bei Entlassung (Rankin ≥ 2) an allen Patienten, die in ihrer ersten Operation elektiv oder dringlich koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden und ohne neurologische Vorerkrankung des ZNS bzw. ohne nachweisbarem präoperativen neurologischen Defizit (Rankin 0)


Krankenhäuser mit mindestens 20 Fällen in dieser Grundgesamtheit:

Minimum - Maximum der Krankenhausergebnisse: 0,0% - 8,3%

Median der Krankenhausergebnisse: 1,4%



Krankenhäuser




77 Krankenhäuser haben mindestens 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit. Das ausgewertete Krankenhaus ist farblich hervorgehoben.

Krankenhäuser mit weniger als 20 Fällen in dieser Grundgesamtheit:

Minimum - Maximum der Krankenhausergebnisse: 0,0% - 0,0%

Median der Krankenhausergebnisse: 0,0%



Krankenhäuser

1 Krankenhaus hat weniger als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit. Das ausgewertete Krankenhaus hat mindestens 20 Fälle und wird daher nicht dargestellt.
 0 Krankenhäuser haben keinen Fall in dieser Grundgesamtheit.

Qualitätsindikator 4: Letalität

In-Hospital-Letalität

Qualitätsziel:	Möglichst geringe In-Hospital-Letalität		
Grundgesamtheit:	Alle Patienten, die in ihrer ersten Operation koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden (siehe Zeilenbeschriftung)		
Kennzahl-ID:	In-Hospital-Letalität (alle Patienten):	2008/HCH-KOMB/28269	
	In-Hospital-Letalität (elektiv/dringlich):	2008/HCH-KOMB/70419	
Referenzbereich:	Definiert für risikoadjustierte In-Hospital-Letalität (siehe Seite 1.17)		

Grundgesamtheit	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008	
	In-Hospital-Letalität		In-Hospital-Letalität	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Alle Patienten, die in ihrer ersten Operation koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden	11 / 236	4,7%	446 / 7.700	5,8%
Vertrauensbereich		2,3% - 8,2%		5,3% - 6,3%
Referenzbereich		nicht definiert		nicht definiert
und OP-Dringlichkeit elektiv/dringlich	9 / 221	4,1%	369 / 7.370	5,0%
Vertrauensbereich		1,9% - 7,6%		4,5% - 5,5%
Referenzbereich		nicht definiert		nicht definiert
Notfall-OP/Notfall-OP bei Reanimation	2 / 15	13,3%	77 / 330	23,3%

Vorjahresdaten	Krankenhaus 2007		Gesamt 2007	
	In-Hospital-Letalität		In-Hospital-Letalität	
Grundgesamtheit	Anzahl	%	Anzahl	%
Alle Patienten, die in ihrer ersten Operation koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden	4 / 207	1,9%	507 / 7.689	6,6%
Vertrauensbereich		0,5% - 4,9%		6,0% - 7,2%
und OP-Dringlichkeit elektiv/dringlich	3 / 198	1,5%	419 / 7.355	5,7%
Vertrauensbereich		0,3% - 4,4%		5,2% - 6,3%


Verteilung der Krankenhausergebnisse [Diagramm 4a, Kennzahl-ID 2008/HCH-KOMB/28269]:

Anteil von Patienten, die im Krankenhaus verstarben an allen Patienten, die in ihrer ersten Operation koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden


Krankenhäuser mit mindestens 20 Fällen in dieser Grundgesamtheit:

Minimum - Maximum der Krankenhausergebnisse: 0,0% - 14,3%

Median der Krankenhausergebnisse: 5,6%



Krankenhäuser




77 Krankenhäuser haben mindestens 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit. Das ausgewertete Krankenhaus ist farblich hervorgehoben.

Krankenhäuser mit weniger als 20 Fällen in dieser Grundgesamtheit:

Minimum - Maximum der Krankenhausergebnisse: 0,0% - 0,0%

Median der Krankenhausergebnisse: 0,0%



Krankenhäuser

1 Krankenhaus hat weniger als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit. Das ausgewertete Krankenhaus hat mindestens 20 Fälle und wird daher nicht dargestellt.
 0 Krankenhäuser haben keinen Fall in dieser Grundgesamtheit.


Verteilung der Krankenhausergebnisse [Diagramm 4b, Kennzahl-ID 2008/HCH-KOMB/70419]:

Anteil von Patienten, die im Krankenhaus verstarben an allen Patienten, die in ihrer ersten Operation elektiv oder dringlich koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden


Krankenhäuser mit mindestens 20 Fällen in dieser Grundgesamtheit:

Minimum - Maximum der Krankenhausergebnisse: 0,0% - 12,7%

Median der Krankenhausergebnisse: 4,5%



Krankenhäuser




77 Krankenhäuser haben mindestens 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit. Das ausgewertete Krankenhaus ist farblich hervorgehoben.

Krankenhäuser mit weniger als 20 Fällen in dieser Grundgesamtheit:

Minimum - Maximum der Krankenhausergebnisse: 0,0% - 0,0%

Median der Krankenhausergebnisse: 0,0%



Krankenhäuser

1 Krankenhaus hat weniger als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit. Das ausgewertete Krankenhaus hat mindestens 20 Fälle und wird daher nicht dargestellt.
 0 Krankenhäuser haben keinen Fall in dieser Grundgesamtheit.

Risikoadjustierung der In-Hospital-Letalität nach logistischem KBA-SCORE

	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Grundgesamtheit				
Alle Patienten, die in ihrer ersten Operation koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden	236	100,0%	7.700	100,0%
davon: Patienten mit vollständiger Dokumentation zum KBA-SCORE	235 / 236	99,6%	7.310 / 7.700	94,9%

	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Beobachtete In-Hospital-Letalität				
Verstorbene Patienten mit vollständiger Dokumentation zum KBA-SCORE	11 / 235	4,7%	416 / 7.310	5,7%
Vertrauensbereich		2,3% - 8,2%		5,2% - 6,2%

Risikoadjustierung der In-Hospital-Letalität

Grundgesamtheit: Alle Patienten, die in ihrer ersten Operation koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden mit vollständiger Dokumentation zum KBA-SCORE

Kennzahl-ID: O / E: 2008/HCH-KOMB/90648
Risikoadjustierte In-Hospital-Letalität: 2008/HCH-KOMB/90649

Referenzbereich: Definiert für risikoadjustierte In-Hospital-Letalität: <= 11,2% (Toleranzbereich; 95%-Perzentil)

KBA-SCORE Risikoklassen	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008	
	In-Hospital-Letalität		In-Hospital-Letalität	
	Vorhergesagt (E ¹)	Beobachtet (O ²)	Vorhergesagt (E ¹)	Beobachtet (O ²)
0 - < 3%	1,1 / 59 1,9%	1 / 59 1,7%	52,1 / 2.578 2,0%	42 / 2.578 1,6%
3 - < 6%	3,5 / 81 4,3%	4 / 81 4,9%	116,6 / 2.735 4,3%	121 / 2.735 4,4%
6 - < 10%	3,5 / 45 7,9%	3 / 45 6,7%	85,8 / 1.121 7,7%	97 / 1.121 8,7%
>= 10%	8,7 / 50 17,4%	3 / 50 6,0%	161,5 / 876 18,4%	156 / 876 17,8%
Summe	16,9 / 235 7,2%	11 / 235 4,7%	416,0 / 7.310 5,7%	416 / 7.310 5,7%

¹ E = erwartet

² O = observiert

	Krankenhaus 2008	Gesamt 2008
In-Hospital-Letalität		
Beobachtet (O)	11 / 235 4,7%	416 / 7.310 5,7%
Vorhergesagt (E)	16,9 / 235 7,2%	416,0 / 7.310 5,7%
O - E ¹	-2,52%	0,00%

¹ Anteil Todesfälle, der über dem erwarteten Anteil liegt. Negative Werte bedeuten, dass die beobachtete In-Hospital-Letalität kleiner ist als erwartet. Positive Werte bedeuten, dass die beobachtete In-Hospital-Letalität größer ist als erwartet.

	Krankenhaus 2008	Gesamt 2008
Verhältniszahl O / E		
O / E ²	0,65	1,00

² Verhältnis der beobachteten In-Hospital-Letalität zur erwarteten In-Hospital-Letalität. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete In-Hospital-Letalität kleiner ist als erwartet und umgekehrt.

Beispiel: O / E = 1,2 Die beobachtete In-Hospital-Letalität ist 20% größer als erwartet.
O / E = 0,9 Die beobachtete In-Hospital-Letalität ist 10% kleiner als erwartet.

	Krankenhaus 2008	Gesamt 2008
Risikoadjustierte In-Hospital-Letalität		
Risikoadjustierte In-Hospital-Letalität ³ Referenzbereich	3,7% <= 11,2%	5,7% <= 11,2%

³ Die risikoadjustierte In-Hospital-Letalität stellt eine risikoadjustierte Letalitätsrate dar, die einen Vergleich zwischen Krankenhäusern ermöglicht. Diese beschreibt die Letalitätsrate die erreicht worden wäre, wenn alle Krankenhäuser denselben Patientenmix gehabt hätten. Die risikoadjustierte In-Hospital-Letalität berechnet sich aus der Multiplikation der beobachteten Gesamletalität mit dem Verhältnis aus beobachteter zu erwarteter Krankenhausletalität ((O / E) * O_{Gesamt}).

	Krankenhaus 2007	Gesamt 2007
Vorjahresdaten In-Hospital-Letalität		
Beobachtet (O)	4 / 206 1,9%	482 / 7.413 6,5%
Vorhergesagt (E)	15,1 / 206 7,3%	426,4 / 7.413 5,8%
O - E	-5,38%	0,75%
O / E	0,27	1,13
Risikoadjustierte In-Hospital-Letalität	1,7%	7,4%


Verteilung der Krankenhausergebnisse [Diagramm 4c, Kennzahl-ID 2008/HCH-KOMB/90648]:

Verhältnis der beobachteten In-Hospital-Letalität zur erwarteten In-Hospital-Letalität bei allen Patienten, die in ihrer ersten Operation koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden und mit vollständiger Dokumentation zum KBA-SCORE


Krankenhäuser mit mindestens 20 Fällen in dieser Grundgesamtheit:

Minimum - Maximum der Krankenhausergebnisse: 0,0 - 3,0

Median der Krankenhausergebnisse: 1,0



Krankenhäuser




O / E

76 Krankenhäuser haben mindestens 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit. Das ausgewertete Krankenhaus ist farblich hervorgehoben.

Krankenhäuser mit weniger als 20 Fällen in dieser Grundgesamtheit:

Minimum - Maximum der Krankenhausergebnisse: 0,0 - 1,1

Median der Krankenhausergebnisse: 0,5



Krankenhäuser

2 Krankenhäuser haben weniger als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit. Das ausgewertete Krankenhaus hat mindestens 20 Fälle und wird daher nicht dargestellt.
 0 Krankenhäuser haben keinen Fall in dieser Grundgesamtheit.


Verteilung der Krankenhausergebnisse [Diagramm 4d, Kennzahl-ID 2008/HCH-KOMB/90649]:

Risikoadjustierte In-Hospital-Letalität bei allen Patienten, die in ihrer ersten Operation koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden und mit vollständiger Dokumentation zum KBA-SCORE


Krankenhäuser mit mindestens 20 Fällen in dieser Grundgesamtheit:

Minimum - Maximum der Krankenhausergebnisse: 0,0% - 17,0%

Median der Krankenhausergebnisse: 5,8%



Krankenhäuser




%

76 Krankenhäuser haben mindestens 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit. Das ausgewertete Krankenhaus ist farblich hervorgehoben.

Krankenhäuser mit weniger als 20 Fällen in dieser Grundgesamtheit:

Minimum - Maximum der Krankenhausergebnisse: 0,0% - 6,1%

Median der Krankenhausergebnisse: 3,1%



Krankenhäuser

2 Krankenhäuser haben weniger als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit.

Das ausgewertete Krankenhaus hat mindestens 20 Fälle und wird daher nicht dargestellt.

0 Krankenhäuser haben keinen Fall in dieser Grundgesamtheit.

30-Tage-Letalität

Qualitätsziel: Möglichst geringe 30-Tage-Letalität

Grundgesamtheit: Alle Patienten, die in ihrer ersten Operation koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden

Notwendige Follow-up-Rate zur Berechnung der 30-Tage-Letalität: $\geq 97\%$

Kennzahl-ID: 2008/HCH-KOMB/47942

Follow-up-Rate

	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Patienten mit bekanntem Status am 30. Tag postoperativ (Follow-up-Rate)	236 / 236	100,0%	5.860 / 7.700	76,1%


Vorjahresdaten	Krankenhaus 2007		Gesamt 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Patienten mit bekanntem Status am 30. Tag postoperativ (Follow-up-Rate)	207 / 207	100,0%	5.632 / 7.689	73,2%

Verteilung der Krankenhausergebnisse [Diagramm 4e, Kennzahl-ID 2008/HCH-KOMB/47942]:

Follow-up-Rate: Anteil von Patienten, deren Status am 30. postoperativen Tag bekannt ist, an allen Patienten, die in ihrer ersten Operation koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden

Minimum - Maximum der Krankhausergebnisse: 0,0% - 100,0%

Median der Krankhausergebnisse: 97,4%



Alle Krankenhäuser sind dargestellt.
 40 Krankenhäuser haben eine Follow-up-Rate von $\geq 97\%$.
 Die gestrichelte Linie markiert den 97%-Bereich.

30-Tage-Letalität

Grundgesamtheit: Alle Patienten, die in ihrer ersten Operation koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden, mit bekanntem Status am 30. Tag postoperativ und aus einem Krankenhaus mit einer 30-Tage-Follow-up-Rate von $\geq 97\%$

Kennzahl-ID: 2008/HCH-KOMB/47944

Referenzbereich: Ein Referenzbereich ist für diesen Qualitätsindikator derzeit nicht definiert.

	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008	
	Anzahl	%	Anzahl	%
30-Tage-Letalität bei Patienten mit Follow-up	12 / 236	5,1%	237 / 4.133	5,7%
Vertrauensbereich		2,6% - 8,7%		5,0% - 6,5%
Referenzbereich		nicht definiert		nicht definiert

Vorjahresdaten	Krankenhaus 2007		Gesamt 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%
30-Tage-Letalität bei Patienten mit Follow-up	7 / 207	3,4%	263 / 4.326	6,1%
Vertrauensbereich		1,4% - 6,9%		5,4% - 6,8%


Verteilung der Krankenhausergebnisse [Diagramm 4f, Kennzahl-ID 2008/HCH-KOMB/47944]:

Anteil von Patienten, die innerhalb von 30 Tagen postoperativ verstarben an allen Patienten, die in ihrer ersten Operation koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden, deren Status am 30. postoperativen Tag bekannt ist und die in einem Krankenhaus operiert wurden, das eine 30-Tage-Follow-up-Rate von $\geq 97\%$ aufweisen kann


Krankenhäuser mit mindestens 20 Fällen in dieser Grundgesamtheit:

Minimum - Maximum der Krankenhausergebnisse: 0,0% - 14,0%

Median der Krankenhausergebnisse: 5,2%



Krankenhäuser




39 Krankenhäuser haben mindestens 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit. Das ausgewertete Krankenhaus ist farblich hervorgehoben.

Krankenhäuser mit weniger als 20 Fällen in dieser Grundgesamtheit:

Minimum - Maximum der Krankenhausergebnisse: 0,0% - 0,0%

Median der Krankenhausergebnisse: 0,0%



Krankenhäuser

1 Krankenhaus hat weniger als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit. Das ausgewertete Krankenhaus hat mindestens 20 Fälle und wird daher nicht dargestellt. 38 Krankenhäuser haben keinen Fall in dieser Grundgesamtheit.

Risikoadjustierung der 30-Tage-Letalität nach logistischem EuroSCORE

Grundgesamtheit	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Alle Patienten, die in einem Krankenhaus mit einer Follow-up-Rate $\geq 97\%$ in ihrer ersten Operation koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden	236		4.144	
davon: Patienten, für die der Status am 30. Tag postoperativ bekannt ist (Follow-up-Rate):				
Gruppe 1	236 / 236	100,0%	4.133 / 4.144	99,7%
davon: Patienten mit vollständiger Dokumentation zum EuroSCORE:				
Gruppe 2	236 / 236	100,0%	3.816 / 4.133	92,3%

Beobachtete 30-Tage-Letalität	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Gruppe 1 Beobachtete 30-Tage-Letalität bei Patienten, für die der Status am 30. Tag postoperativ bekannt ist und aus einem Krankenhaus mit einer Follow-up-Rate $\geq 97\%$	12 / 236	5,1%	237 / 4.133	5,7%
Gruppe 2 Beobachtete 30-Tage-Letalität bei Patienten mit vollständiger Dokumentation zum EuroSCORE und bekanntem Status am 30. Tag postoperativ und aus einem Krankenhaus mit einer Follow-up-Rate $\geq 97\%$ Vertrauensbereich	12 / 236	5,1% 2,6% - 8,7%	218 / 3.816	5,7% 5,0% - 6,5%

Vorjahresdaten	Krankenhaus 2007		Gesamt 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Gruppe 2 Beobachtete 30-Tage-Letalität bei Patienten mit vollständiger Dokumentation zum EuroSCORE und bekanntem Status am 30. Tag postoperativ und aus einem Krankenhaus mit einer Follow-up-Rate $\geq 97\%$ Vertrauensbereich	7 / 207	3,4% 1,4% - 6,9%	255 / 4.245	6,0% 5,3% - 6,8%


Verteilung der Krankenhausergebnisse [Diagramm 4g, Kennzahl-ID 2008/HCH-KOMB/47954]:

Anteil von Patienten, die innerhalb von 30 Tagen postoperativ verstarben an allen Patienten, die in ihrer ersten Operation koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden, deren Status am 30. postoperativen Tag bekannt ist und mit vollständiger Dokumentation zum EuroSCORE und die in einem Krankenhaus operiert wurden, das eine 30-Tage-Follow-up-Rate von $\geq 97\%$ aufweisen kann


Krankenhäuser mit mindestens 20 Fällen in dieser Grundgesamtheit:

Minimum - Maximum der Krankenhausergebnisse: 0,0% - 13,1%

Median der Krankenhausergebnisse: 5,2%



Krankenhäuser




39 Krankenhäuser haben mindestens 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit. Das ausgewertete Krankenhaus ist farblich hervorgehoben.

Krankenhäuser mit weniger als 20 Fällen in dieser Grundgesamtheit:

Minimum - Maximum der Krankenhausergebnisse: 0,0% - 0,0%

Median der Krankenhausergebnisse: 0,0%



Krankenhäuser

1 Krankenhaus hat weniger als 20 Fälle in dieser Grundgesamtheit. Das ausgewertete Krankenhaus hat mindestens 20 Fälle und wird daher nicht dargestellt. 38 Krankenhäuser haben keinen Fall in dieser Grundgesamtheit.

Grundgesamtheit Risikoadjustierung: Gruppe 2

Patienten mit vollständiger Dokumentation zum EuroSCORE und bekanntem Status am 30. Tag postoperativ

EuroSCORE- Risikoklassen	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008	
	30-Tage-Letalität		30-Tage-Letalität	
	Vorhergesagt (E ¹)	Beobachtet (O ²)	Vorhergesagt (E ¹)	Beobachtet (O ²)
0 - < 3%	0,2 / 11 2,1%	0 / 11 0,0%	8,0 / 353 2,3%	3 / 353 0,8%
3 - < 6%	1,6 / 35 4,6%	1 / 35 2,9%	41,1 / 915 4,5%	29 / 915 3,2%
6 - < 10%	3,2 / 42 7,6%	2 / 42 4,8%	68,1 / 867 7,9%	43 / 867 5,0%
>= 10%	42,0 / 148 28,4%	9 / 148 6,1%	377,5 / 1.681 22,5%	143 / 1.681 8,5%
Summe	47,0 / 236 19,9%	12 / 236 5,1%	494,7 / 3.816 13,0%	218 / 3.816 5,7%

¹ E = erwartet

² O = beobachtet

	Krankenhaus 2008	Gesamt 2008
O - E ³	-14,84%	-7,25%

³ Anteil Todesfälle, der über dem erwarteten Anteil liegt. Negative Werte bedeuten, dass die beobachtete 30-Tage-Letalität kleiner ist als erwartet. Positive Werte bedeuten, dass die beobachtete 30-Tage-Letalität größer ist als erwartet.

	Krankenhaus 2008	Gesamt 2008
O / E*	0,26	0,44

* Verhältnis der beobachteten 30-Tage-Letalität zur erwarteten 30-Tage-Letalität. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete 30-Tage-Letalität kleiner ist als erwartet und umgekehrt.

Beispiel: O / E = 1,2 Die beobachtete 30-Tage-Letalität ist 20% größer als erwartet

O / E = 0,9 Die beobachtete 30-Tage-Letalität ist 10% kleiner als erwartet

	Krankenhaus 2008	Gesamt 2008
Risikoadjustierte 30-Tage-Letalität**	1,5%	2,5%

** Die risikoadjustierte 30-Tage-Letalität stellt eine risikoadjustierte – fiktive – Letalitätsrate dar, die einen Vergleich zwischen Krankenhäusern ermöglicht. Sie kann jedoch bzgl. ihrer Höhe nicht als Sterbewahrscheinlichkeit in diesem Krankenhaus für einen Patienten mit durchschnittlichen Risiken interpretiert werden. Die risikoadjustierte 30-Tage-Letalität berechnet sich aus der Multiplikation der beobachteten Gesamletalität mit dem Verhältnis aus beobachteter zu erwarteter Krankenhausletalität ((O / E) * O_{Gesamt}).

BQS-Bundesauswertung 2008
Kombinierte Koronar- und
Aortenklappenchirurgie

Basisauswertung

MediClin Herzzentrum Lahr/Baden

Teilnehmende Krankenhäuser (Bundesdaten): 78
Anzahl Datensätze Gesamt: 7.705
Datensatzversion: HCH 2008 11.0
Datenbankstand: 15. März 2009
2008 - D7858-L58366-P26771

Übersicht Basisauswertung


Tabellen		Seite
Allgemeine Angaben		
Anzahl Operationen		2.2
Verweildauer		2.2
Basisbogen (präoperativ)		
Patientenbasisdaten		2.3
Anamnese/Befund		2.5
Kardiale Befunde		2.8
Vorausgegangene Eingriffe		2.8
Aktuelle weitere Erkrankungen		2.9
Operationsbogen		
OP-Basisdaten		2.12
Koronarchirurgie		2.16
Aortenklappenchirurgie		2.18
Basisbogen (postoperativ)		
Postoperativer Verlauf		2.22
Bei Ende der Behandlung		2.26
Entlassung/Verlegung		2.27
Follow-up-Bogen		2.28
Grafiken		
1	Postoperative Verweildauer	2.2
2	Altersverteilung	2.3
3	Operationszeit	2.14
4	Aortenabklemmzeit	2.15

Allgemeine Angaben	Krankenhaus 2008	Gesamt 2008	Krankenhaus 2007
	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Anzahl Operationen	236	7.706	207
Anzahl Patienten, die mindestens einmal kombiniert an den Koronarien und der Aortenklappe operiert wurden	236	7.705	207
Verweildauer (Tage)			
Gesamtverweildauer			
Anzahl Patienten mit gültigen Angaben	236	7.700	207
Median ¹	11,0	14,0	10,0
präoperative Verweildauer			
Anzahl Patienten mit gültigen Angaben	236	7.700	207
Median ¹	1,0	2,0	2,0
postoperative Verweildauer			
Anzahl Patienten mit gültigen Angaben	236	7.700	207
Median ¹	9,0	11,0	8,0

¹ bezogen auf Patienten, die in ihrer ersten Operation koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden

Kommentar: Die Prozentzahlen der Basisauswertung beziehen sich, sofern kein anderer Nenner angegeben ist, auf alle Patienten, die mindestens einmal kombiniert an den Koronarien und der Aortenklappe operiert wurden. Beim Operationsbogen beziehen diese sich auf die Anzahl der Operationen.


Diagramm 1: Postoperative Verweildauer (Tage)



Basisbogen (präoperativ)

Patientenbasisdaten	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008		Krankenhaus 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Anzahl Patienten, die mindestens einmal kombiniert an den Koronarien und der Aortenklappe operiert wurden	236		7.705		207	
B 05 Alter (Jahre) (Werte zwischen > 17 und < 130) Anzahl Patienten mit gültigen Angaben	236		7.705		207	
Mittelwert		74,1		73,6		73,8
fehlende/ungültige Werte	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Diagramm 2: B 05 Altersverteilung (Jahre)



Patientenbasisdaten	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008		Krankenhaus 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Anzahl Patienten, die mindestens einmal kombiniert an den Koronarien und der Aortenklappe operiert wurden	236		7.705		207	
B 06 Geschlecht						
männlich	153	64,8	5.248	68,1	134	64,7
weiblich	83	35,2	2.457	31,9	73	35,3
fehlende Werte	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B 07 Körpergröße (cm) (Werte zwischen >= 50 und < 250)						
Anzahl Patienten mit gültigen Angaben	236		7.667		207	
Mittelwert		168,7		169,4		167,9
unbekannt	0	0,0	36	0,5	0	0,0
fehlende/ungültige Werte	0	0,0	2	0,0	0	0,0
B 08 Körpergewicht vor OP (kg) (Werte zwischen >= 30 und <= 230)						
Anzahl Patienten mit gültigen Angaben	236		7.664		207	
Mittelwert		80,8		80,1		78,4
unbekannt	0	0,0	38	0,5	0	0,0
fehlende/ungültige Werte	0	0,0	3	0,0	0	0,0

Anamnese/Befund	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008		Krankenhaus 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Anzahl Patienten, die mindestens einmal kombiniert an den Koronarien und der Aortenklappe operiert wurden	236		7.705		207	
B 09 klinischer Schweregrad der Herzinsuffizienz (NYHA-Klassifikation)						
(I): Beschwerdefreiheit, normale körperliche Belastbarkeit	6	2,5	478	6,2	12	5,8
(II): Beschwerden bei stärkerer körperlicher Belastung	72	30,5	1.997	25,9	77	37,2
(III): Beschwerden bei leichter körperlicher Belastung	144	61,0	4.541	58,9	111	53,6
(IV): Beschwerden in Ruhe	14	5,9	689	8,9	7	3,4
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B 10 Angina Pectoris (nach CCS)						
nein	105	44,5	2.326	30,2	125	60,4
CCS I (Angina pectoris bei schwerer Belastung)	11	4,7	527	6,8	9	4,3
CCS II (Angina pectoris bei mittlerer Belastung)	54	22,9	1.843	23,9	37	17,9
CCS III (Angina pectoris bei leichter Belastung)	48	20,3	2.533	32,9	29	14,0
CCS IV (Angina pectoris in Ruhe)	18	7,6	476	6,2	7	3,4
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B 11 Infarkt(e)						
nein	199	84,3	6.127	79,5	173	83,6
ja, letzte(r) innerhalb der letzten 48 Stunden	3	1,3	195	2,5	2	1,0
ja, letzte(r) innerhalb der letzten 21 Tage	6	2,5	325	4,2	7	3,4
ja, letzte(r) länger als 21 Tage, weniger als 91 Tage zurück	8	3,4	244	3,2	5	2,4
ja, letzte(r) länger als 91 Tage zurück	20	8,5	735	9,5	20	9,7
ja, letzter Zeitpunkt unbekannt	0	0,0	64	0,8	0	0,0
unbekannt	0	0,0	15	0,2	0	0,0
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Anamnese/Befund Anzahl Patienten, die mindestens einmal kombiniert an den Koronarien und der Aortenklappe operiert wurden	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008		Krankenhaus 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
	236		7.705		207	
B 12 kardiogener Schock/ Dekompensation						
nein	212	89,8	6.653	86,3	174	84,1
ja, letzte(r) innerhalb der letzten 48 Stunden	2	0,8	173	2,2	7	3,4
ja, letzte(r) innerhalb der letzten 21 Tage	9	3,8	462	6,0	13	6,3
ja, letzte(r) länger als 21 Tage zurück	13	5,5	398	5,2	13	6,3
ja, letzter Zeitpunkt unbekannt	0	0,0	16	0,2	0	0,0
unbekannt	0	0,0	3	0,0	0	0,0
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B 13 Reanimation						
nein	233	98,7	7.589	98,5	206	99,5
ja, letzte innerhalb der letzten 48 Stunden	0	0,0	47	0,6	0	0,0
ja, letzte innerhalb der letzten 21 Tage	0	0,0	30	0,4	0	0,0
ja, letzte länger als 21 Tage zurück	3	1,3	35	0,5	1	0,5
ja, letzter Zeitpunkt unbekannt	0	0,0	3	0,0	0	0,0
unbekannt	0	0,0	1	0,0	0	0,0
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B 14 Patient wird beatmet						
nein	236	100,0	7.631	99,0	199	96,1
ja	0	0,0	74	1,0	8	3,9
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B 15 pulmonale Hypertonie						
nein	220	93,2	6.796	88,2	187	90,3
ja	16	6,8	887	11,5	20	9,7
unbekannt	0	0,0	22	0,3	0	0,0
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Anamnese/Befund Anzahl Patienten, die mindestens einmal kombiniert an den Koronarien und der Aortenklappe operiert wurden	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008		Krankenhaus 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
	236		7.705		207	
B 16 Herzrhythmus bei Aufnahme						
Sinusrhythmus	200	84,7	6.519	84,6	183	88,4
Vorhofflimmern	29	12,3	940	12,2	21	10,1
anderer Rhythmus	7	3,0	246	3,2	3	1,4
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B 17 Schrittmacher-Träger						
nein	219	92,8	7.354	95,4	190	91,8
ja, Schrittmacher	16	6,8	318	4,1	17	8,2
Defibrillator	1	0,4	33	0,4	0	0,0
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B 18 Einstufung nach ASA-Klassifikation						
1: normaler, ansonsten gesunder Patient	2	0,8	222	2,9	2	1,0
2: mit leichter Allgemeinerkrankung	13	5,5	1.145	14,9	20	9,7
3: mit schwerer Allgemeinerkrankung und Leistungseinschränkung	215	91,1	5.387	69,9	166	80,2
4: mit inaktivierender Allgemeinerkrankung, ständige Lebensbedrohung	4	1,7	906	11,8	18	8,7
5: moribunder Patient	2	0,8	45	0,6	1	0,5

Kardiale Befunde Anzahl Patienten, die mindestens einmal kombiniert an den Koronarien und der Aortenklappe operiert wurden	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008		Krankenhaus 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
	236		7.705		207	
B 19 LVEF						
1 = schlecht oder < 30%	3	1,3	556	7,2	11	5,3
2 = mittel oder 30% - 50%	44	18,6	2.352	30,5	47	22,7
3 = gut oder > 50%	189	80,1	4.797	62,3	149	72,0
B 20 Koronarangiographiebefund						
keine KHK	15	6,4	261	3,4	13	6,3
1-Gefäßkrankung	66	28,0	1.946	25,3	65	31,4
2-Gefäßkrankung	56	23,7	2.264	29,4	57	27,5
3-Gefäßkrankung	99	41,9	3.234	42,0	72	34,8
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B 21 signifikante Hauptstammstenose						
nein	199	84,3	6.595	85,6	183	88,4
ja, gleich oder größer 50%	36	15,3	1.097	14,2	24	11,6
unbekannt	1	0,4	13	0,2	0	0,0
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Vorausgegangene Eingriffe Anzahl Patienten, die mindestens einmal kombiniert an den Koronarien und der Aortenklappe operiert wurden	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008		Krankenhaus 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
	236		7.705		207	
B 22 PCI						
nein	235	99,6	6.546	85,0	72	34,8
ja	1	0,4	1.159	15,0	135	65,2
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B 23 Vor-OP an Herz/Aorta						
keine	190	80,5	7.169	93,0	192	92,8
mindestens eine Voroperation	46	19,5	535	6,9	15	7,2
unbekannt	0	0,0	1	0,0	0	0,0
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Aktuelle weitere Erkrankungen Anzahl Patienten, die mindes- tens einmal kombiniert an den Koronarien und der Aorten- klappe operiert wurden	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008		Krankenhaus 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
	236		7.705		207	
B 24 akute Infektion(en) (Mehrfachnennungen möglich)						
00 keine Infektion	227	96,2	7.418	96,3	201	97,1
01 Mediastinitis	0	0,0	5	0,1	1	0,5
02 Bakteriämie	1	0,4	11	0,1	1	0,5
03 broncho-pulmonale Infektion	1	0,4	74	1,0	1	0,5
04 oto-laryngologische Infektion	0	0,0	6	0,1	0	0,0
05 floride Endokarditis	1	0,4	77	1,0	1	0,5
06 Peritonitis	0	0,0	0	0,0	0	0,0
07 Wundinfektion, Thorax	0	0,0	0	0,0	0	0,0
08 Pleuraempyem	0	0,0	0	0,0	0	0,0
09 Venenkatheterinfektion	0	0,0	0	0,0	0	0,0
10 Harnwegsinfektion	5	2,1	63	0,8	0	0,0
11 Wundinfektion, untere Extremitäten	0	0,0	9	0,1	0	0,0
12 HIV-Infektion	0	0,0	1	0,0	0	0,0
13 Hepatitis B oder C	0	0,0	16	0,2	2	1,0
18 andere Wundinfektion	0	0,0	8	0,1	0	0,0
88 sonstige Infektion	1	0,4	36	0,5	0	0,0
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B 25 Diabetes mellitus						
nein	157	66,5	5.146	66,8	120	58,0
ja, diätetisch behandelt	15	6,4	403	5,2	18	8,7
orale Medikation	26	11,0	1.059	13,7	20	9,7
mit Insulin behandelt	35	14,8	1.049	13,6	48	23,2
unbehandelt	3	1,3	21	0,3	0	0,0
unbekannt	0	0,0	27	0,4	1	0,5
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B 26 arterielle Gefäß- erkrankung						
nein	156	66,1	5.706	74,1	170	82,1
ja	80	33,9	1.985	25,8	37	17,9
unbekannt	0	0,0	14	0,2	0	0,0
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
wenn ja: (Mehrfachnennungen möglich)						
periphere AVK (Extremitäten)	24 / 80	30,0	976 / 1.985	49,2	17 / 37	45,9
Arteria Carotis	50 / 80	62,5	1.059 / 1.985	53,4	25 / 37	67,6
Aortenaneurysma	9 / 80	11,3	217 / 1.985	10,9	5 / 37	13,5
sonstige arterielle Gefäß- erkrankung(en)	6 / 80	7,5	245 / 1.985	12,3	3 / 37	8,1

Aktuelle weitere Erkrankungen Anzahl Patienten, die mindes- tens einmal kombiniert an den Koronarien und der Aorten- klappe operiert wurden	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008		Krankenhaus 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
	236		7.705		207	
B 31 Lungen- erkrankung(en)						
nein	205	86,9	6.480	84,1	185	89,4
ja, COPD mit Dauermedikation	12	5,1	614	8,0	11	5,3
ja, COPD ohne Dauermedikation	15	6,4	380	4,9	6	2,9
andere Lungenerkrankungen	4	1,7	218	2,8	5	2,4
unbekannt	0	0,0	13	0,2	0	0,0
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B 32 neurologische Erkrankung(en)						
nein	231	97,9	6.975	90,5	190	91,8
ja, ZNS, zerebrovaskulär (Blutung, Ischämie)	0	0,0	466	6,0	12	5,8
ja, ZNS, andere peripher	1	0,4	146	1,9	3	1,4
Kombination	4	1,7	84	1,1	0	0,0
unbekannt	0	0,0	22	0,3	2	1,0
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	12	0,2	0	0,0
Bei neurologischer Erkran- kung, ZNS, zerebrovaskulär						
B 33 Schweregrad der Behinderung						
Rankin 0	0 / 0		201 / 466	43,1	10 / 12	83,3
Rankin 1	0 / 0		110 / 466	23,6	0 / 12	0,0
Rankin 2	0 / 0		106 / 466	22,7	2 / 12	16,7
Rankin 3	0 / 0		38 / 466	8,2	0 / 12	0,0
Rankin 4	0 / 0		4 / 466	0,9	0 / 12	0,0
Rankin 5	0 / 0		7 / 466	1,5	0 / 12	0,0

Aktuelle weitere Erkrankungen Anzahl Patienten, die mindestens einmal kombiniert an den Koronarien und der Aortenklappe operiert wurden	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008		Krankenhaus 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
	236		7.705		207	
B 34 präoperative Nierenersatztherapie						
nein	231	97,9	7.446	96,6	200	96,6
akut	0	0,0	86	1,1	1	0,5
chronisch	5	2,1	173	2,2	6	2,9
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B 35 Kreatininwert i. S. (präoperativ) (mg/dl) (Werte > 0 und < 99,9)						
Anzahl Patienten mit gültigen Angaben	231		5.934		200	
Median		1,1		1,0		1,1
<i>fehlende/ungültige Werte</i>	5	2,1	1.771	23,0	7	3,4
B 36 Kreatininwert i. S. (präoperativ) (µmol) (Werte > 0 und < 9.999)						
Anzahl Patienten mit gültigen Angaben	0		1.296		0	
Median				91,0		
<i>fehlende/ungültige Werte</i>	236	100,0	6.409	83,2	207	100,0


Operationsbogen

OP-Basisdaten	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008		Krankenhaus 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Anzahl Operationen	236		7.706		207	
Kategorien durchgeführter Eingriffe						
O 39 Koronarchirurgie						
nein	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ja	236	100,0	7.706	100,0	207	100,0
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
O 40 Aortenklappen- chirurgie						
nein	0	0,0	0	0,0	0	0,0
ja	236	100,0	7.706	100,0	207	100,0
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
O 41 sonstige Operation am Herzen						
nein	236	100,0	7.706	100,0	207	100,0
ja	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0

OP-Basisdaten	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008		Krankenhaus 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Anzahl Operationen	236		7.706		207	
O 43 Dringlichkeit						
elektiv	140	59,3	5.504	71,4	123	59,4
dringlich	81	34,3	1.868	24,2	75	36,2
Notfall	13	5,5	289	3,8	7	3,4
Notfall (Reanimation/ultima ratio)	2	0,8	45	0,6	2	1,0
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
O 44 Nitrate (i.v.)						
nein	163	69,1	7.351	95,4	126	60,9
ja	73	30,9	355	4,6	81	39,1
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
O 45 Troponin positiv						
nein	223	94,5	7.203	93,5	199	96,1
ja	13	5,5	503	6,5	8	3,9
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
O 46 Inotrope (i.v.)						
nein	127	53,8	7.195	93,4	82	39,6
ja	109	46,2	511	6,6	125	60,4
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
O 47 (präoperativ) mechanische Kreislaufunterstützung						
keine	235	99,6	7.653	99,3	203	98,1
IABP	1	0,4	50	0,6	4	1,9
andere	0	0,0	3	0,0	0	0,0
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
O 48 Wundkontaminationsklassifikation (nach Definition der CDC)						
aseptische Eingriffe	212	89,8	7.545	97,9	199	96,1
bedingt aseptische Eingriffe	19	8,1	132	1,7	7	3,4
kontaminierte Eingriffe	3	1,3	7	0,1	1	0,5
septische Eingriffe	2	0,8	22	0,3	0	0,0


OP-Basisdaten	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008		Krankenhaus 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Anzahl Operationen	236		7.706		207	
O 49 OP-Vorgehen						
mit HLM	235	99,6	7.697	99,9	206	99,5
ohne HLM	1	0,4	7	0,1	1	0,5
Umstieg von OP ohne HLM auf OP mit HLM	0	0,0	2	0,0	0	0,0
fehlende Werte	0	0,0	0	0,0	0	0,0
O 50 Zugang						
konventionelle Sternotomie	234	99,2	7.680	99,7	207	100,0
andere	2	0,8	26	0,3	0	0,0
fehlende Werte	0	0,0	0	0,0	0	0,0
O 51 OP-Zeit (min) (Werte zwischen > 0 und <= 998)						
Anzahl gültiger Angaben	236		7.706		207	
Median		237,5		215,0		217,0
unbekannt	0	0,0	0	0,0	0	0,0
fehlende/ungültige Werte	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Diagramm 3: O 51 Operationszeit (min)



OP-Basisdaten	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008		Krankenhaus 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Anzahl Operationen	236		7.706		207	
O 52 Bypasszeit (min) (Werte zwischen > 0 und <= 998)						
Anzahl gültiger Angaben	236		7.656		206	
Median		128,0		116,0		122,5
nicht bekannt	0	0,0	34	0,4	0	0,0
fehlende/ungültige Werte	0	0,0	16	0,2	1	0,5
O 53 Aortenabklemmzeit (min) (Werte zwischen > 0 und <= 998)						
Anzahl gültiger Angaben	236		7.663		206	
Median		96,0		80,0		88,5
nicht bekannt	0	0,0	25	0,3	0	0,0
fehlende/ungültige Werte	0	0,0	18	0,2	1	0,5

Diagramm 4: O 53 Aortenabklemmzeit (min)



Koronarchirurgie	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008		Krankenhaus 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Anzahl Operationen	236		7.706		207	
O 54 Anzahl der Grafts						
keine	0	0,0	6	0,1	0	0,0
1	108	45,8	3.293	42,7	96	46,4
2	96	40,7	2.610	33,9	80	38,6
3	27	11,4	1.481	19,2	31	15,0
4	5	2,1	283	3,7	0	0,0
5	0	0,0	30	0,4	0	0,0
6	0	0,0	3	0,0	0	0,0
7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
> 8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
fehlende Werte	0	0,0	0	0,0	0	0,0
bei Graft(s), Art						
O 55 Vene						
ja	141 / 236	59,7	5.775 / 7.700	75,0	146 / 207	70,5
O 56 ITA links						
ja	153 / 236	64,8	5.037 / 7.700	65,4	137 / 207	66,2
O 57 ITA rechts						
ja	39 / 236	16,5	422 / 7.700	5,5	21 / 207	10,1
O 58 A. radialis						
ja	6 / 236	2,5	176 / 7.700	2,3	0 / 207	0,0
O 59 sonstige Grafts						
ja	0 / 236	0,0	8 / 7.700	0,1	0 / 207	0,0

Koronarchirurgie	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008		Krankenhaus 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Anzahl Operationen	236		7.706		207	
O 60 Zentrale Anastomosen						
Anzahl gültiger Angaben	236		7.706		207	
Mittelwert		0,9		1,1		1,0
0	64	27,1	1.782	23,1	50	24,2
1	133	56,4	3.737	48,5	120	58,0
2	35	14,8	1.802	23,4	33	15,9
3	4	1,7	357	4,6	4	1,9
4	0	0,0	27	0,4	0	0,0
5	0	0,0	1	0,0	0	0,0
6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
fehlende Werte	0	0,0	0	0,0	0	0,0
O 61 Periphere Anastomosen, arteriell						
Anzahl gültiger Angaben	236		7.706		207	
Mittelwert		1,0		0,8		0,9
0	65	27,5	2.645	34,3	62	30,0
1	131	55,5	4.415	57,3	124	59,9
2	23	9,7	452	5,9	10	4,8
3	13	5,5	130	1,7	9	4,3
4	4	1,7	57	0,7	1	0,5
5	0	0,0	7	0,1	1	0,5
6	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
fehlende Werte	0	0,0	0	0,0	0	0,0
O 62 Periphere Anastomosen, venös						
Anzahl gültiger Angaben	236		7.706		207	
Mittelwert		1,0		1,2		1,1
0	96	40,7	2.004	26,0	60	29,0
1	69	29,2	3.076	39,9	83	40,1
2	46	19,5	1.830	23,7	48	23,2
3	24	10,2	671	8,7	14	6,8
4	1	0,4	106	1,4	2	1,0
5	0	0,0	17	0,2	0	0,0
6	0	0,0	2	0,0	0	0,0
7	0	0,0	0	0,0	0	0,0
8	0	0,0	0	0,0	0	0,0
fehlende Werte	0	0,0	0	0,0	0	0,0
O 61, O 62 Periphere Anastomosen, Gesamt						
Anzahl gültiger Angaben	236		7.706		207	
Mittelwert		2,0		2,0		2,0

Koronarchirurgie	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008		Krankenhaus 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Anzahl Operationen	236		7.706		207	
O 63 TEA						
nein	235	99,6	7.329	95,1	49	23,7
ja, links	1	0,4	87	1,1	157	75,8
rechts	0	0,0	236	3,1	1	0,5
beidseitig	0	0,0	54	0,7	0	0,0
fehlende Werte	0	0,0	0	0,0	0	0,0
bei Graft(s), versorgte Koronararterien						
O 64 LAD und/oder Äste						
ja	177	75,0	5.941	77,1	156	75,4
O 65 RCA und/oder Äste						
ja	128	54,2	3.917	50,8	120	58,0
O 66 RCX und/oder Äste						
ja	109	46,2	3.878	50,3	87	42,0
O 67 anderer Koronareingriff						
keiner	236	100,0	7.602	98,7	206	99,5
ja	0	0,0	104	1,3	1	0,5
fehlende Werte	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Aortenklappenchirurgie	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008		Krankenhaus 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Anzahl Operationen	236		7.706		207	
O 68 Stenose						
nein	8	3,4	508	6,6	10	4,8
ja	228	96,6	7.198	93,4	197	95,2
fehlende Werte	0	0,0	0	0,0	0	0,0
O 69 Insuffizienz						
nein	89	37,7	4.246	55,1	65	31,4
ja	147	62,3	3.460	44,9	142	68,6
fehlende Werte	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Aortenklappenchirurgie	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008		Krankenhaus 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Anzahl Operationen	236		7.706		207	
O 70 Klappeneingriff						
11 Ersatz der nativen Klappe durch mechanische Klappe	11	4,7	1.027	13,3	20	9,7
12 Ersatz der nativen Klappe durch Bioklappe	219	92,8	6.448	83,7	175	84,5
18 Ersatz der nativen Klappe durch eine andere Klappe	1	0,4	25	0,3	1	0,5
21 Ersatz einer mechanischen Klappe durch eine mechanische Klappe	2	0,8	18	0,2	1	0,5
22 Ersatz einer mechanischen Klappe durch eine Bioklappe	1	0,4	29	0,4	1	0,5
28 Ersatz einer mechanischen Klappe durch eine andere Klappe	0	0,0	1	0,0	0	0,0
31 Ersatz einer Bioklappe durch eine mechanische Klappe	0	0,0	9	0,1	0	0,0
32 Ersatz einer Bioklappe durch eine Bioklappe	1	0,4	60	0,8	3	1,4
38 Ersatz einer Bioklappe durch eine andere Klappe	0	0,0	3	0,0	0	0,0
41 offene Exploration der Klappe ohne Korrektur	1	0,4	12	0,2	1	0,5
42 Sprengung der Klappe (auch Kommissurotomie) und Rekonstruktion	0	0,0	1	0,0	0	0,0
43 Entkalkung	0	0,0	5	0,1	2	1,0
44 Prothesenfixation	0	0,0	0	0,0	0	0,0
45 Prothesenreinigung (Thrombenentfernung)	0	0,0	1	0,0	0	0,0
51 isolierte Sprengung der Klappe (auch Kommissurotomie)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
52 isolierte Rekonstruktion mit Implantat	0	0,0	3	0,0	2	1,0
53 isolierte Rekonstruktion ohne Implantat	0	0,0	30	0,4	0	0,0
88 anderer Klappeneingriff	0	0,0	34	0,4	1	0,5
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Aortenklappenchirurgie	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008		Krankenhaus 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Anzahl Operationen	236		7.706		207	
O 71 Herzklappen (als Ersatz) Ventil- bzw. Ringtyp						
mechanische Klappenventile						
1101 Kugelventil	0	0,0	4	0,1	0	0,0
1102 Hubdeckelventil	0	0,0	0	0,0	0	0,0
1103 Kippscheibventil	0	0,0	32	0,4	0	0,0
1104 Zweiflügelklappe	12	5,1	994	12,9	21	10,1
1105 Dreiflügelklappe	0	0,0	5	0,1	0	0,0
1188 andere mechanische Klappe	0	0,0	4	0,1	0	0,0
biologische Klappenventile						
1201 Porcin <i>mit</i> Stent	54	22,9	2.982	38,7	43	20,8
1202 Porcin <i>ohne</i> Stent	157	66,5	402	5,2	109	52,7
1203 Xeno-Perikard <i>mit</i> Stent	2	0,8	2.720	35,3	6	2,9
1204 Xeno-Perikard <i>stentless</i>	1	0,4	392	5,1	12	5,8
1205 andere Hetero <i>mit</i> Stent	0	0,0	35	0,5	0	0,0
1206 andere Hetero <i>ohne</i> Stent	7	3,0	12	0,2	7	3,4
1207 Homologe <i>mit</i> Stent	1	0,4	3	0,0	0	0,0
1208 Homologe <i>ohne</i> Stent	0	0,0	3	0,0	1	0,5
1209 Autologe <i>mit</i> Stent	0	0,0	3	0,0	0	0,0
1210 Autologe <i>ohne</i> Stent	1	0,4	4	0,1	1	0,5
1288 anderes biologisches Klappenventil	0	0,0	15	0,2	1	0,5

Aortenklappenchirurgie	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008		Krankenhaus 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Anzahl Operationen	236		7.706		207	
hybride Klappenventile/ andere Ventile						
1388 hybride Klappenventile/ andere Ventile	0	0,0	9	0,1	0	0,0
mechanische Ringimplantate						
2101 geschlossen, flexibel	0	0,0	3	0,0	0	0,0
2102 geschlossen, starr	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2103 offen, flexibel	0	0,0	1	0,0	0	0,0
2104 offen, starr	0	0,0	0	0,0	1	0,5
biologische Ringimplantate						
2201 geschlossen	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2202 offen	0	0,0	0	0,0	1	0,5
hybride Ringimplantate/ andere Ringimplantate						
2301 geschlossen	0	0,0	0	0,0	0	0,0
2302 offen	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<i>fehlende Werte</i>	1	0,4	83	1,1	4	1,9
O 72 Durchmesser (mm) (Werte > 0 und < 99)						
Anzahl Patienten mit gültigen Angaben	235		7.623		203	
Mittelwert		24,4		23,4		24,0
<i>fehlende/ungültige Werte</i>	1	0,4	83	1,1	4	1,9

Basisbogen (postoperativ)

Postoperativer Verlauf Anzahl Patienten, die mindestens einmal kombiniert an den Koronarien und der Aortenklappe operiert wurden	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008		Krankenhaus 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
	236		7.705		207	
B 73 Dauer Intensiv- aufenthalt (Tage)						
0	1	0,4	113	1,5	2	1,0
1	29	12,3	2.243	29,1	20	9,7
2	29	12,3	1.400	18,2	34	16,4
3	27	11,4	915	11,9	50	24,2
>= 4	150	63,6	3.033	39,4	101	48,8
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B 74 Mobilisation						
Patient ist/wurde nicht mobilisiert	14	5,9	438	5,7	13	6,3
Aufstehen am 1. postoperativen Tag	166	70,3	3.366	43,7	87	42,0
Aufstehen am 2. postoperativen Tag	25	10,6	1.733	22,5	70	33,8
Aufstehen am 3. postoperativen Tag oder später	31	13,1	1.964	25,5	37	17,9
nicht beurteilbar	0	0,0	204	2,6	0	0,0
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B 75 Mediastinitis						
nein	235	99,6	7.667	99,5	206	99,5
ja	1	0,4	38	0,5	1	0,5
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B 76 Reanimation						
nein	229	97,0	7.424	96,4	201	97,1
ja	7	3,0	281	3,6	6	2,9
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B 77 Myokardinfarkt						
nein	235	99,6	7.605	98,7	205	99,0
ja	1	0,4	100	1,3	2	1,0
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B 78 Low Cardiac Output						
nein	130	55,1	6.847	88,9	166	80,2
ja, konservativ therapiert	97	41,1	522	6,8	30	14,5
IABP	9	3,8	315	4,1	11	5,3
andere mechanische Kreislaufunterstützung	0	0,0	21	0,3	0	0,0
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Postoperativer Verlauf Anzahl Patienten, die mindestens einmal kombiniert an den Koronarien und der Aortenklappe operiert wurden	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008		Krankenhaus 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
	236		7.705		207	
B 79 Rethorakotomie/ Grund (Mehrfachnennungen möglich)						
keine Rethorakotomie	215	91,1	7.051	91,5	193	93,2
Blutung/Hämatom	17	7,2	450	5,8	8	3,9
Low Cardiac Output	2	0,8	25	0,3	4	1,9
Tamponade	0	0,0	110	1,4	2	1,0
Graftprobleme, Ischämie	0	0,0	13	0,2	0	0,0
Wundinfektion/Mediastinitis	2	0,8	28	0,4	2	1,0
Dissektion	0	0,0	2	0,0	0	0,0
Prothesendysfunktion	1	0,4	5	0,1	1	0,5
instabiles Sternum	2	0,8	49	0,6	0	0,0
Chylothorax	0	0,0	0	0,0	0	0,0
anderer Grund	1	0,4	41	0,5	1	0,5
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B 80 respiratorische Insuffizienz						
nein	180	76,3	6.212	80,6	138	66,7
ja, mit forcierter Atemtherapie	46	19,5	977	12,7	58	28,0
Reintubation	3	1,3	230	3,0	6	2,9
Tracheotomie	7	3,0	286	3,7	5	2,4
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B 81 zerebrovaskuläres Ereignis bis zur Entlassung						
nein	232	98,3	7.437	96,5	201	97,1
ja	4	1,7	268	3,5	6	2,9
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
wenn ja:						
Dauer bis einschließlich 24 h	0 / 4	0,0	67 / 268	25,0	1 / 6	16,7
Dauer mehr als 24 h bis einschließlich 72 h	1 / 4	25,0	52 / 268	19,4	4 / 6	66,7
Dauer über 72 h	3 / 4	75,0	149 / 268	55,6	1 / 6	16,7

Postoperativer Verlauf Anzahl Patienten, die mindestens einmal kombiniert an den Koronarien und der Aortenklappe operiert wurden	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008		Krankenhaus 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
	236		7.705		207	
B 83 Schweregrad eines neurologischen Defizits bei Entlassung bei Dauer des zerebrovasculären Ereignisses > 24 h						
Rankin 0	1 / 4	25,0	30 / 201	14,9	3 / 5	60,0
Rankin 1	0 / 4	0,0	17 / 201	8,5	1 / 5	20,0
Rankin 2	0 / 4	0,0	41 / 201	20,4	1 / 5	20,0
Rankin 3	3 / 4	75,0	40 / 201	19,9	0 / 5	0,0
Rankin 4	0 / 4	0,0	25 / 201	12,4	0 / 5	0,0
Rankin 5	0 / 4	0,0	34 / 201	16,9	0 / 5	0,0
Rankin 6	0 / 4	0,0	14 / 201	7,0	0 / 5	0,0
B 84 Psychosyndrom						
nein	198	83,9	6.242	81,0	186	89,9
ja, flüchtig, ohne Therapie	0	0,0	598	7,8	4	1,9
ja, therapierelevant, mit Therapie	38	16,1	865	11,2	17	8,2
fehlende Werte	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B 85 therapiepflichtige gastrointestinale Komplikation(en)						
nein	235	99,6	7.348	95,4	203	98,1
konservativ	0	0,0	200	2,6	4	1,9
interventionell	0	0,0	66	0,9	0	0,0
Laparotomie	1	0,4	91	1,2	0	0,0
fehlende Werte	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B 86 Kreatininwert i. S. (postoperativ) (mg/dl) (Werte > 0 und < 99,9)						
Anzahl gültiger Angaben	236		6.365		207	
Median		1,3		1,1		1,0
fehlende/ungültige Werte	0	0,0	1.340	17,4	0	0,0
B 87 Kreatininwert i. S. (postoperativ) (µmol) (Werte > 0 und < 9.999)						
Anzahl gültiger Angaben	0		1.336		0	
Median				102,0		
fehlende/ungültige Werte	236	100,0	6.369	82,7	207	100,0

Postoperativer Verlauf Anzahl Patienten, die mindestens einmal kombiniert an den Koronarien und der Aortenklappe operiert wurden	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008		Krankenhaus 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
	236		7.705		207	
B 88 postoperative Nierenersatztherapie						
nein	211	89,4	7.075	91,8	184	88,9
akut	23	9,7	506	6,6	19	9,2
chronisch	2	0,8	124	1,6	4	1,9
fehlende Werte	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B 89 Erythrozytenkonzentrat(e) (Einheiten) (Werte zwischen > 0 und < 99)						
Anzahl gültiger Angaben	144		5.114		128	
Median		4,0		4,0		3,0
kein Erythrozytenkonzentrat	92	39,0	2.478	32,2	79	38,2
fehlende/ungültige Werte	0	0,0	113	1,5	0	0,0
B 90 FFP (Einheiten) (Werte zwischen > 0 und < 99)						
Anzahl gültiger Angaben	64		2.354		51	
Median		2,0		4,0		3,0
kein FFP	172	72,9	5.351	69,4	156	75,4
fehlende/ungültige Werte	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B 91 Thrombozytenkonzentrat						
nein	179	75,8	6.421	83,3	172	83,1
ja	57	24,2	1.284	16,7	35	16,9
fehlende Werte	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Bei Ende der Behandlung Anzahl Patienten, die mindestens einmal kombiniert an den Koronarien und der Aortenklappe operiert wurden	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008		Krankenhaus 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
	236		7.705		207	
B 92 Herzrhythmus bei Entlassung						
Sinusrhythmus	168	71,2	6.024	78,2	155	74,9
Vorhofflimmern	58	24,6	984	12,8	37	17,9
anderer Rhythmus	10	4,2	697	9,0	15	7,2
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0
B 93 Patient trägt Schrittmacher/Defibrillator						
nein	222	94,1	7.225	93,8	179	86,5
Schrittmacher	14	5,9	457	5,9	26	12,6
Defibrillator	0	0,0	23	0,3	2	1,0
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Entlassung/Verlegung Anzahl Patienten, die mindestens einmal kombiniert an den Koronarien und der Aortenklappe operiert wurden	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008		Krankenhaus 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
	236		7.705		207	
B 96 Entlassungsgrund¹						
01: regulär beendet	26	11,0	1.749	22,7	5	2,4
02: nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,0	49	0,6	0	0,0
03: aus sonstigen Gründen	0	0,0	4	0,1	0	0,0
04: gegen ärztlichen Rat	0	0,0	9	0,1	0	0,0
05: Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,0	1	0,0	0	0,0
06: Verlegung	68	28,8	1.937	25,1	107	51,7
07: Tod	11	4,7	450	5,8	4	1,9
08: Verlegung nach § 14	0	0,0	138	1,8	0	0,0
09: in Rehabilitationseinrichtung	131	55,5	3.206	41,6	91	44,0
10: in Pflegeeinrichtung	0	0,0	30	0,4	0	0,0
11: in Hospiz	0	0,0	0	0,0	0	0,0
12: interne Verlegung	0	0,0	42	0,5	0	0,0
13: externe Verlegung	0	0,0	1	0,0	0	0,0
14: aus sonstigen Gründen, mit nachstationärer Behandlung	0	0,0	1	0,0	0	0,0
15: gegen ärztlichen Rat	0	0,0	1	0,0	0	0,0
16: externe Verlegung (Wechsel BPfIV/KHEntgG)	0	0,0	7	0,1	0	0,0
17: interne Verlegung (Wechsel BPfIV/KHEntgG)	0	0,0	0	0,0	0	0,0
18: Rückverlegung	0	0,0	75	1,0	0	0,0
19: Wiederaufnahme mit Neueinstufung	0	0,0	2	0,0	0	0,0
20: Wiederaufnahme mit Neueinstufung wegen Komplikation	0	0,0	0	0,0	0	0,0
21: Wiederaufnahme	0	0,0	3	0,0	0	0,0
22: Fallabschluss ²	0	0,0	0	0,0	-	-

¹ vollständige Bezeichnung für gekürzte Entlassungsgründe:

- | | |
|--|--|
| 01 Behandlung regulär beendet | 15 Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen |
| 02 Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen | 16 Externe Verlegung mit Rückverlegung oder Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPfIV oder für besondere Einrichtungen nach §17b Abs. 1 Satz 15 KHG mit Rückverlegung |
| 03 Behandlung aus sonstigen Gründen beendet | 17 interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen, nach der BPfIV oder für besondere Einrichtungen nach §17b Abs. 1 Satz 15 KHG |
| 04 Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet | 19 Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung |
| 06 Verlegung in ein anderes Krankenhaus | 20 Entlassung vor Wiederaufnahme mit Neueinstufung wegen Komplikation |
| 08 Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit (§14 Abs. 5 Satz 2 BPfIV) | 21 Entlassung oder Verlegung mit nachfolgender Wiederaufnahme |
| 09 Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung | 22 Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll- und teilstationärer Behandlung |
| 10 Entlassung in eine Pflegeeinrichtung | |
| 11 Entlassung in ein Hospiz | |
| 14 Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen | |

² Entlassungsgrund 22 (Fallabschluss) wird erst seit 01.01.2008 erhoben.

Follow-up-Bogen

Follow-up	Krankenhaus 2008		Gesamt 2008		Krankenhaus 2007	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Anzahl Patienten, die mindestens einmal kombiniert an den Koronarien und der Aortenklappe operiert wurden	236		7.705		207	
FU 98 Status des Patienten am 30. Tag postoperativ (nach der ersten OP)						
folgende Angaben beziehen sich auf alle Patienten:	236	100,0	7.705	100,0	207	100,0
Patient verstorben	12	5,1	365	4,7	7	3,4
Patient lebt	224	94,9	5.499	71,4	200	96,6
Falldokumentation vor dem 30. Tag postoperativ abgeschlossen/FU-Information liegt noch nicht vor, wird nachgeschickt	0	0,0	116	1,5	0	0,0
Situation des Patienten ist unbekannt	0	0,0	665	8,6	0	0,0
<i>fehlende Werte</i>	0	0,0	1.060	13,8	0	0,0

Leseanleitung

1. Aufbau der Auswertung

Die Auswertung setzt sich zusammen aus der Auswertung definierter Qualitätsindikatoren, die eine Bewertung der Qualität der Gesamtversorgung sowie der einzelnen Krankenhäuser erlaubt, und einer Basisauswertung, die eine Zusammenfassung der erhobenen Qualitätssicherungsdaten gibt.

2. Qualitätsindikatoren

Einen Überblick über die wesentlichen Ergebnisse der Qualitätsindikatoren bietet die Übersichtsseite, auf der alle Gesamtergebnisse mit ihren Referenzbereichen zusammenfassend dargestellt sind.

Nachfolgend werden dann die Ergebnisse zu den einzelnen Qualitätsindikatoren ausführlich dargestellt. Dazu wird im Titel zunächst die Bezeichnung des Qualitätsindikators genannt und anschließend das angestrebte Qualitätsziel sowie die betrachtete Grundgesamtheit dieses Qualitätsindikators beschrieben. Unter Kennzahl-ID ist die Bezeichnung der einzelnen Qualitätskennzahl mit Angabe zum Auswertungsjahr, Leistungsbereich und Kennzahl-Nummer aufgeführt. Danach sind alle Qualitätskennzahlen, für die auch eine grafische Darstellung der Krankenhausergebnisse erfolgt, eindeutig identifizierbar.

Sofern ein Referenzbereich für eine Qualitätskennzahl definiert ist (vgl. 2.2), wird dieser hier aufgeführt.

In der Tabelle sind dann die Ergebnisse zu dem Qualitätsindikator dargestellt. Die Zeilen- bzw. Spaltenbeschriftungen erklären, was die Kennzahlen in der Tabelle darstellen (z.B. welches Ereignis gezählt wird oder wie ggf. die Grundgesamtheit weiter eingeschränkt ist).

Sowohl in der Beschreibung der Grundgesamtheit als auch in den Zeilen- und Spaltenbeschriftungen ist dabei ein "oder" als logisches, d.h. inklusives "oder" zu verstehen im Sinne von "und/oder".

Die Berechnung des Vertrauensbereichs (vgl. 2.1) sowie die grafische Darstellung der Krankenhausergebnisse (vgl. 2.3) erfolgt nur für die farblich hervorgehobenen Kennzahlen des Qualitätsindikators.

2.1 Vertrauensbereich

Der Vertrauensbereich gibt den Wertebereich an, in dem sich das Ergebnis eines Krankenhauses bei der Messung eines Qualitätsindikators unter Berücksichtigung aller zufälligen Ereignisse mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit befindet. In dieser Auswertung wird eine Wahrscheinlichkeit von 95% festgelegt.

Beispiel:

Qualitätsindikator:	Postoperative Wundinfektion
Kennzahl zum Qualitätsindikator:	Anteil von Patienten mit postoperativer Wundinfektion an allen Patienten
Krankenhauswert:	10,0%
Vertrauensbereich:	8,2 - 11,8%

D.h. berücksichtigt man alle zufälligen Faktoren, wie z.B. Dokumentationsfehler etc., liegt die wahre Wundinfektionsrate des Krankenhauses mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% zwischen 8,2 und 11,8 Prozent.

Die Größe des Vertrauensbereiches hängt von folgenden Parametern ab:

1. der Sicherheitswahrscheinlichkeit (95%)
2. der Anzahl der Fälle (z.B. Anzahl der operierten Patienten)
3. der Anzahl der Ereignisse (z.B. Anzahl der Patienten mit postoperativer Wundinfektion)

2.2 Referenzbereiche

Der Referenzbereich gibt den Bereich eines Qualitätsindikators für gute Qualität an (so genannter Unauffälligkeitsbereich).

Zurzeit sind nicht für alle Qualitätsindikatoren oder Qualitätskennzahlen Referenzbereiche definiert.

Anstelle des Referenzbereichs wird hier "Ein Referenzbereich ist für diesen Qualitätsindikator derzeit nicht definiert." bzw.

"Ein Referenzbereich ist für diese Qualitätskennzahl derzeit nicht definiert." platziert, um zu verdeutlichen,

dass für spätere Auswertungen hier ein Referenzbereich nachgetragen werden kann. Auf der Übersichtsseite und in der Ergebnistabelle zum einzelnen Qualitätsindikator findet sich entsprechend der Eintrag "nicht definiert".

2.2.1 Ziel- und Toleranzbereiche

Referenzbereiche werden danach unterschieden, auf welcher wissenschaftlichen Basis die Festlegung erfolgt.

Dazu unterscheidet man in "Zielbereiche" und "Toleranzbereiche":

Zielbereich:

Für einige Qualitätsindikatoren kann aufgrund wissenschaftlicher Untersuchungen definiert werden, welches Ergebnis als gute Qualität anzusehen ist, ob es also im Zielbereich liegt. Für diese Indikatoren wird ein fester Wert als Referenzbereich festgelegt. Dies gilt beispielsweise für die Bestimmung der Hormonempfindlichkeit der Krebszellen bei Brustkrebs. Diese Untersuchung soll möglichst immer durchgeführt werden. Wissenschaftliche Untersuchungen und praktische Erfahrungen zeigen, dass ein Ergebnis von 95% (Anteil der behandelten Patienten, bei denen diese Bestimmung durchgeführt wurde) von allen Krankenhäusern erreicht werden kann.

Toleranzbereich:

Für einige Qualitätsindikatoren gibt es keine eindeutige feste Grenze. So kann man die Häufigkeit von Komplikationen, die nach Operationen auftreten können, als Indikatoren für Ergebnisqualität verwenden. Da diese Komplikationen aber auch bei bester Behandlung nicht hundertprozentig vermeidbar sind, kann man zwar das Ziel formulieren, dass die Komplikationen möglichst selten auftreten sollen, man kann aber keine sichere Grenze festlegen, die erreichbar gute Qualität kennzeichnet. Bei diesen Qualitätsindikatoren lässt sich folglich kein Referenzbereich angeben, der erreichbar gute Qualität klar beschreibt. Mit Hilfe von Vergleichsergebnissen können aber besonders auffällige Ergebnisse erkannt werden. Häufig werden in diesen Fällen Perzentil-Referenzbereiche verwendet.

Ergebnisse, die innerhalb dieses Referenzbereiches liegen, können toleriert werden. Ergebnisse, die außerhalb des Toleranzbereichs liegen, müssen genauer analysiert werden.

2.2.2 Fixe und variable (Perzentil-)Referenzbereiche

Darüberhinaus werden fixe und variable (Perzentil-)Referenzbereiche unterschieden:

a) Referenzbereiche, die durch einen festen Wert definiert sind (**fixer Referenzbereich**)

Beispiel:

Es wird festgelegt, dass eine Rate von 15% Wundinfektionen noch nicht als auffällig gelten soll. Damit ist ein Referenzbereich von $\leq 15\%$ definiert, d.h. die Krankenhäuser mit Wundinfektionsraten $> 15\%$ gelten als auffällig.

b) Referenzbereiche, die durch die Verteilung der Krankenhausergebnisse festgelegt sind (**Perzentil-Referenzbereich**)

Beispiel:

Es wird festgelegt, dass die 10% der Krankenhäuser mit den höchsten Wundinfektionsraten als auffällig gelten sollen.

Damit ist ein Referenzbereich (= Unauffälligkeitsbereich) von $\leq 90\%$ -Perzentil definiert.

Die Berechnung des Perzentils beruht dabei auf den Ergebnissen der Krankenhäuser mit mindestens 20 Fällen in der betrachteten Grundgesamtheit auf der Basis des BQS-Bundesdatenpools 2008.

Im Fall a) ist der Referenzbereich fix und die Anzahl der auffälligen Krankenhäuser kann je nach Verteilung schwanken.

Wohingegen im Fall b) der Anteil der auffälligen Krankenhäuser festgelegt ist, aber der tatsächliche Referenzbereich je nach Verteilung anders ausfällt.

Ein Spezialfall von a) ergibt sich bei so genannten "Sentinel Event"-Qualitätsindikatoren. Hier stellt bereits ein einziger Fall, der die Merkmale des entsprechenden Qualitätsindikators besitzt, eine Auffälligkeit dar. Technisch bedeutet dies, dass der Referenzbereich hier mit einem Wert von 0% gleichzusetzen ist. Für solche Qualitätsindikatoren wird in der Auswertung als Referenzbereich "Sentinel Event" aufgeführt.

2.2.3 Bestimmung von Auffälligkeiten

Die Ergebnisse eines Krankenhauses gelten als auffällig, wenn sie außerhalb des Referenzbereiches liegen.

Beispiele:

Referenzbereich: $\leq 2,5\%$

5 von 200 = $2,5\% \leq 2,5\%$ (unauffällig)

5 von 195 = $2,6\%$ (gerundet) $> 2,5\%$ (auffällig)

Hinweis:

Auch wenn das in der Auswertung gerundet dargestellte Ergebnis anscheinend im Referenzbereich liegt, kann der exakte Wert außerhalb des Referenzbereichs liegen und das Ergebnis damit auffällig sein:

Bei einem Referenzbereich von $\leq 2,5\%$

ergeben 4 Wundinfektionen bei 157 Fällen eine Infektionsrate von $2,54777070\%$ (gerundet $2,5\%$).

Diese ist größer als $2,5\%$ und damit auffällig.

Auch der umgekehrte Fall ist möglich:

Bei einem Referenzbereich von $< 6\%$

ergeben 12 Schlaganfälle bei 201 Fällen einen Anteil von $5,97014925\%$ (gerundet $6,0\%$).

Dieser ist kleiner als 6% und damit unauffällig.

Das in der Auswertung gerundet dargestellte Ergebnis liegt anscheinend außerhalb des Referenzbereichs, der exakte Wert liegt aber innerhalb.

2.3 Vorjahresdaten

Parallel zu den Ergebnissen des Jahres 2008 sind in der Auswertung auch die Ergebnisse für das Jahr 2007 dargestellt. Diese befinden sich in der Tabelle "Vorjahresdaten" und beinhalten die Kennzahlen zum Qualitätsindikator sowie den dazugehörigen Vertrauensbereich, gerechnet mit den Daten des Vorjahres. Diese Art der Darstellung ermöglicht den Vergleich der Ergebnisse im Zeitverlauf.

Gerechnet wird mit den Rechenregeln der BQS-Bundesauswertung 2008. Zu Abweichungen der Ergebnisse zwischen der Tabelle "Vorjahresdaten" und der BQS-Bundesauswertung 2007 kommt es deshalb in den Fällen, wo die Rechenregeln des Qualitätsindikators für 2008 überarbeitet worden sind.

Bei eingeschränkter Vergleichbarkeit wird das in einer Fußnote unter der Tabelle "Vorjahresdaten" erläutert.

2.4 Grafische Darstellung der Krankenhausergebnisse

Für die farblich hinterlegte(n) Kennzahl(en) eines Qualitätsindikators werden die Ergebnisse der Krankenhäuser grafisch dargestellt.

Krankenhäuser, die in der betrachteten Grundgesamtheit keinen Fall dokumentiert haben, werden grafisch nicht dargestellt. Es wird nur die Anzahl dieser Krankenhäuser aufgeführt.

Die Krankenhäuser, die mindestens 20 Fälle in der betrachteten Grundgesamtheit der Kennzahl dokumentiert haben, werden sowohl im Benchmarkdiagramm (vgl. 2.4.1) als auch im Histogramm (vgl. 2.4.2) dargestellt. Dabei erscheinen Krankenhäuser, die mit ihren Ergebnissen außerhalb eines definierten Referenzbereiches liegen, im Benchmarkdiagramm vor einem farbigen Hintergrund.

Die Verteilung der Ergebnisse von Krankenhäusern mit weniger als 20 dokumentierten Fällen in der Grundgesamtheit ist in einem weiteren Benchmarkdiagramm abgebildet. Die Darstellung eines Referenzbereiches erfolgt hier nicht.

Bei einem Vergleich der beiden Benchmarkdiagramme ist zu beachten, dass die y-Achsen oft nicht gleich skaliert sind.

Als zusätzliche Information sind über den Grafiken jeweils die Spannweite und der Median der Krankenhausergebnisse aufgeführt.


Was unter einem "Fall" zu verstehen ist, ist jeweils abhängig von der Definition der Grundgesamtheit des Qualitätsindikators. So kann damit neben einem "Patienten" z.B. auch eine "Operation" oder eine "Intervention" gemeint sein.

2.4.1 Benchmarkdiagramm

Für jedes Krankenhaus wird der zugehörige Wert der Kennzahl des Qualitätsindikators durch eine Säule dargestellt. Die Säulen werden so angeordnet, dass Krankenhäuser mit guter Qualität immer rechts stehen.

Beispiel:

Qualitätsindikator: Postoperative Komplikationen
 Kennzahl zum Qualitätsindikator: Anteil von Patienten mit postoperativen Komplikationen an allen Patienten



2.4.2 Histogramm

Für die Darstellung der Verteilung der Krankenhausergebnisse in einem Histogramm werden die von den Krankenhäusern erreichten Werte der Kennzahl des Qualitätsindikators in Klassen aufgeteilt. Für jede Klasse wird die Anzahl der Krankenhäuser ermittelt, für die die zugehörige Kennzahl in diese Klasse fällt.

Im Histogramm repräsentiert jede Säule eine Klasse. Die Säulenhöhe entspricht der Anzahl der Krankenhäuser, deren berechnete Kennzahl in der jeweiligen Klasse liegt.


Beispiel:

Qualitätsindikator: Postoperative Komplikationen
 Kennzahl zum Qualitätsindikator: Anteil von Patienten ohne postoperative Komplikationen an allen Patienten
 Mögliche Klasseneinteilung:

1. Klasse: $\leq 60\%$
2. Klasse: $> 60\%$ bis $\leq 70\%$
3. Klasse: $> 70\%$ bis $\leq 80\%$
4. Klasse: $> 80\%$ bis $\leq 90\%$
5. Klasse: $> 90\%$ bis $\leq 100\%$

Verteilung der Krankenhäuser auf die Klassen:

Klasse	$\leq 60\%$	$60\% - 70\%$	$70\% - 80\%$	$80\% - 90\%$	$90\% - 100\%$
Anzahl Krankenhäuser mit Ergebnis in der Klasse	1	2	2	4	3



Damit Krankenhäuser mit „guter“ Qualität im Histogramm immer rechts stehen, kann es passieren, dass die natürliche Reihenfolge der Klassen-Skala (von „klein“ nach „groß“) im Histogramm umgedreht wird (von „groß“ nach „klein“).

Aus Darstellungsgründen wird die Klasse, die ganz links steht, immer so gewählt, dass sie bis zum minimalen bzw. maximalen realisierten Krankenhauswert der Kennzahl geht. In der Regel ist diese Klasse damit größer als die anderen Klassen, die eine fest vorgegebene Breite besitzen.


Das Histogramm liefert gegenüber dem Säulendiagramm weitere Informationen zu folgenden Fragestellungen:

- Welcher Wert der Kennzahl des Qualitätsindikators wird im Mittel angenommen? (Lage der Verteilung)
- Gibt es genauso viele „gute“ wie „schlechte“ Krankenhäuser? (Symmetrie der Verteilung)
- Gibt es starke Unterschiede zwischen den Krankenhäusern? (Streuung der Verteilung)

2.4.3 Box-and-Whisker-Plot

Im **Box-and-Whisker-Plot** werden Daten anhand von Perzentilen zusammenfassend dargestellt. Die Box (Schachtel) wird begrenzt durch das 25%- und das 75%-Perzentil (Q1 bzw. Q3). Diese umfasst demnach die mittleren 50% der Verteilung. Die Whiskers (die Box ausdehnende, dünne "Schnurrhaar-Linien") verbinden die Box mit dem 5%-Perzentil (P05) bzw. dem 95%-Perzentil (P95). Minimum und Maximum werden durch einen Stern gekennzeichnet. Wenn das Minimum oder das Maximum außerhalb der Achsenskalierung liegt, wird der Stern nicht dargestellt und der Wert ist am Rand eingetragen.

Der Median teilt die Anzahl der Beobachtungen (hier teilnehmende Krankenhäuser) in zwei Hälften. Ein Viertel der Verteilung liegt zwischen dem Median und der linken Begrenzung der Box (Q1: 1. Quartil), ein Viertel liegt zwischen dem Median und der rechten Begrenzung der Box (Q3: 3. Quartil). Der Median wird von extremen Werten (Ausreißern) praktisch kaum beeinflusst. Deshalb kann er bei schiefen, unsymmetrischen Verteilungen besser interpretiert werden als der arithmetische Mittelwert (MW), der zusätzlich als schwarzer Punkt eingetragen ist.



3. Basisauswertung

In der Basisauswertung werden sämtliche Items des entsprechenden Datensatzes deskriptiv ausgewertet. In einigen Fällen gibt es zur Basisauswertung ergänzende Auswertungen, die weitergehende Aspekte des betreffenden Leistungsbereichs beleuchten sollen.

4. Fehlende Werte und Mehrfachnennungen

Es kann vorkommen, dass Prozentangaben in der Summe kleiner oder größer sind als 100%.

Für den ersten Fall, dass die Summe kleiner als 100% ist, sind fehlende Angaben verantwortlich. D.h. für die an 100% fehlenden Fälle wurden keine oder ungültige Angaben gemacht.

Prozentsummen von über 100% lassen sich dadurch erklären, dass Mehrfachnennungen möglich waren.

5. Wechsel der Grundgesamtheit

Allgemein ist bei der Interpretation von statistischen Kennzahlen darauf zu achten, welche Bezugsgröße für die Berechnung gewählt wurde. So ergeben sich z.B. unterschiedliche Auslegungen eines prozentualen Anteils, wenn einmal das Patientenkollektiv und ein anderes mal die Operationen die Bezugsgröße bilden.

Eine Einschränkung der Grundgesamtheit wird häufig dadurch angezeigt, dass die entsprechende Zeilenbeschriftung in der Tabelle etwas nach rechts eingerückt ist.

6. Interpretation der Ergebnisse

Statistiken geben keinen direkten Hinweis auf gute oder schlechte Qualität, sondern bedürfen fachkundiger Interpretation und ggf. weitergehender Analysen.

7. Glossar

Anteil

Eine Rate beschreibt den prozentualen Anteil einer Merkmalsausprägung unter allen betrachteten Merkmalsträgern (Grundgesamtheit).

Beziehungszahl

Siehe Verhältniszahl

Konfidenzintervall

Siehe Vertrauensbereich

Kennzahl(en) eines Qualitätsindikators (Qualitätskennzahlen)

Kennzahlen eines Qualitätsindikators geben die zahlenmäßige Ausprägung des Qualitätsindikators für den Bundes- oder Landesdatenpool (Gesamtrate) und das einzelne Krankenhaus wieder. Jedem Qualitätsindikator sind ein oder manchmal auch mehrere Qualitätskennzahlen zugeordnet. Qualitätskennzahlen sind in der Tabelle farblich hervorgehoben und werden zusammen mit ihrem Vertrauensbereich und - sofern definiert - ihrem Referenzbereich angegeben. Die Verteilung der Kennzahl wird jeweils als Benchmarkdiagramm und als Histogramm dargestellt (Verteilung der Krankenhausergebnisse).

Kennzahl-ID einer Qualitätskennzahl

Eine Kennzahl-ID mit Angabe zum Auswertungsjahr, Leistungsbereich und Kennzahl-Nummer ermöglicht eine eindeutige Identifikation einer Qualitätskennzahl, für die die Krankenhausergebnisse grafisch dargestellt werden. Z.B. steht die Bezeichnung 2008/HCH-AORT/28269 für das Ergebnis des Qualitätsindikators "Letalität" im Leistungsbereich Herzchirurgie (HCH) im Auswertungsjahr 2008.

Diese Angabe zur Kennzahl-Nummer (z.B. 28269) ermöglicht eine schnelle Suche im Internet auf den Homepages der BQS.

Median der Krankenhausergebnisse

Der Median ist derjenige Wert, für den 50% der Krankenhausergebnisse kleiner und 50% der Krankenhausergebnisse größer sind. Der Median ist ein Maß, das den Mittelpunkt der Verteilung beschreibt.

Perzentil der Krankenhausergebnisse

Für das x%-Perzentil der Krankenhausergebnisse gilt, dass x% der Krankenhausergebnisse kleiner oder gleich dem x%-Perzentil sind. Haben beispielsweise 25% der untersuchten Krankenhäuser eine Wundinfektionsrate von 1,5% oder kleiner, so entspricht hier der Wert von 1,5% dem 25%-Perzentil.

Rate

Siehe Anteil

Statistische Maßzahlen

Das Gesamtergebnis sowie die Verteilung der Krankenhausergebnisse werden durch statistische Maßzahlen beschrieben.

Spannweite der Krankenhausergebnisse

Die Spannweite gibt den minimalen und maximalen Wert der Krankenhausergebnisse an. Die Spannweite ist ein Maß für die Streuung der Verteilung.

Verhältniszahl

Der Quotient zweier sachlich in Verbindung stehender Merkmale heißt Beziehungszahl. Dabei ist nicht wie bei einer Rate der Zähler eine Untermenge des Nenners. Im Weiteren wird die Bezeichnung „Verhältniszahl“ verwendet.

Vertrauensbereich

Der Vertrauensbereich gibt den Wertebereich an, in dem der prozentuale Anteil mit einer Wahrscheinlichkeit von 95% unter Berücksichtigung aller zufälligen Ereignisse (z.B. Dokumentationsfehler, natürliche Schwankungen beim Leistungsprozess etc.) liegt.

Risikoadjustierung der In-Hospital-Letalität mit dem logistischen Regressionsmodell: KCH-SCORE 3.0, AKL-SCORE, KBA-SCORE

Joachim Kötting, BQS Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung gGmbH, Düsseldorf

Aktualisierung der HCH-SCOREs anhand der BQS-Bundesdaten 2008

HINWEIS: Der AKL-SCORE für die isolierte Aortenklappenchirurgie und der KBA-SCORE für die kombinierte Bypass- und Aortenklappenchirurgie, die als Entwurf zur Musterauswertung 2008 anhand der Daten zum Erfassungsjahr 2007 entwickelt wurden, sind jetzt auf der Grundlage der BQS-Bundesdaten 2008 aktualisiert worden. Eine Anpassung der Modelle zum Erfassungsjahr 2008 war insbesondere für isolierte Eingriffe an der Aortenklappe geboten, da in diesem Jahr erstmals transfemorale kathetergestützte Eingriffe der Dokumentationspflicht unterlagen und diese bei der Modellbildung mit berücksichtigt werden sollten. Der KCH-SCORE für die isolierte Koronarchirurgie wurde aus Gründen der besseren zeitlichen Vergleichbarkeit der Ergebnisse zwischen den drei Leistungsbereichen ebenfalls auf Basis der BQS-Bundesdaten 2008 neu angepasst und liegt somit für das Erfassungsjahr 2008 in der Version 3.0 vor. Zur besseren inhaltlichen Vergleichbarkeit wurde darauf geachtet, dass die potenziellen Einflussfaktoren auf die In-Hospital-Letalität mit derselben Definition in die Modellbildung der einzelnen Leistungsbereiche einfließen konnten. Dies führte insbesondere dazu, dass das Alter jetzt in allen drei Leistungsbereichen in fünf Altersklassen dargestellt wird.

1. Einleitung

Die Letalität wird als der wichtigste Qualitätsindikator nach herzchirurgischen Eingriffen betrachtet. Die Letalitätsrate eines Krankenhauses hängt dabei nicht allein von der Qualität der erbrachten Leistung ab, sondern wird unter anderem durch Vorerkrankungen, unterschiedliche Schweregrade der Grunderkrankung und auch krankheitsunabhängige Merkmale wie z. B. Alter oder Geschlecht seiner Patienten beeinflusst. Das Ergebnis eines Krankenhauses hängt also auch davon ab, welches Risikoprofil die Patienten eines Krankenhauses besitzen. Ein Krankenhaus, in dem sehr häufig Hoch-Risiko-Patienten behandelt werden, lässt in der Regel eine höhere Letalität erwarten als ein Krankenhaus mit wenigen Hoch-Risiko-Patienten. Ein schlechteres Ergebnis muss in solchen Fällen nicht automatisch eine schlechtere Qualität der Versorgung bedeuten. Erst eine angemessene Berücksichtigung unterschiedlicher Risiken im Patientenmix sorgt für einen fairen Vergleich.

Dazu werden risikoadjustierte Qualitätsdarstellungen genutzt. Um einen möglichen gemeinsamen Einfluss mehrerer Risikofaktoren zu erkennen und zu gewichten, können multiple logistische Regressionsmodelle eingesetzt werden, deren Ergebnisse in einem weiteren Schritt zur Berechnung risikoadjustierter Letalitätsraten genutzt werden können. Bekannte Beispiele sind die seit 1996 regelmäßig vom New York State Department of Health (1996 bis 2008) herausgegebenen Cardiac Surgery Reports oder der im europäischen Raum weit verbreitete additive oder logistische EuroSCORE (Roques et al. 1999, Michel et al. 2003). Beim Vergleich deutscher herzchirurgischer Kliniken mittels EuroSCORE stellte sich heraus, dass die erwarteten Letalitätsraten einzelner Kliniken inzwischen zum Teil deutlich überschätzt werden. Um schließlich einen fairen Vergleich der deutschen Krankenhäuser untereinander zu ermöglichen, hatte sich die BQS gemeinsam mit der Fachgruppe Herzchirurgie entschlossen, für die BQS-Bundesauswertung 2004 einen logistischen Score für die isolierte Koronarchirurgie (KCH-SCORE) auf der Grundlage aktuellerer Daten zu entwickeln (BQS-Qualitätsreport 2004).

Für die isolierte Aortenklappenchirurgie (AKL-SCORE) und die kombinierte Bypass- und Aortenklappenchirurgie (KBA-SCORE) stehen für die BQS-Bundesauswertung 2008 erstmals eigens entwickelte Risikoadjustierungsmodelle zur Verfügung. Diese wurden aktuell auf der Basis des BQS-Bundesdatenpools 2008 berechnet. Um für die isolierte Koronarchirurgie eine sowohl zeitliche als auch inhaltliche Vergleichbarkeit zu gewährleisten, wurde der KCH-SCORE nun ebenfalls auf die BQS-Bundesdaten 2008 neu angepasst und liegt somit in Version 3.0 vor (KCH-SCORE 3.0).

2. Der KCH-SCORE 3.0 (isolierte Koronarchirurgie)

Entwicklung des logistischen Modells

Bei der Aktualisierung des Modells wurde auf den Datenpool der BQS-Bundesauswertung 2008 zurückgegriffen, in dem 45.514 Patienten dokumentiert sind, die in ihrer ersten Operation isoliert koronarchirurgisch operiert wurden. Es wurden folgende potenzielle Risikofaktoren auf einen gemeinsamen Einfluss auf die In-Hospital-Letalität bei isoliert koronarchirurgischen Eingriffen überprüft: Alter, Geschlecht, Body Mass Index, klinischer Schweregrad der Herzinsuffizienz (NYHA-Klassifikation), Angina pectoris (nach CCS), Myokardinfarkt, Troponin positiv, instabile Angina, kritischer präoperativer Status, pulmonale Hypertonie, Herzrhythmus bei Aufnahme, linksventrikuläre Dysfunktion, 3-Gefäßerkrankung, signifikante Hauptstammstenose, vorausgegangene PCI, Vor-OP an Herz/Aorta, präoperativer Kreatininwert oder Nierenersatztherapie, Diabetes mellitus (insulinpflichtig), arterielle Gefäßerkrankung, Lungenerkrankung(en), neurologische Dysfunktion, Notfall.

Unter Verwendung von multiplen logistischen Regressionsmodellen lassen sich nicht nur Aussagen darüber treffen, ob bestimmte Faktoren überhaupt einen Einfluss auf einen bestimmten binären Zustand (z. B. lebendig / tot) eines Patienten ausüben, auch lässt sich der simultane Einfluss dieser Risikofaktoren auf eine Erkrankungs- oder Versterbenswahrscheinlichkeit quantifizieren.

Zunächst wurde eine Variablenselektion nach mathematisch-statistischen Gesichtspunkten durchgeführt, bei der zum Signifikanzniveau 5% statistisch nicht signifikante Variablen aus der Modellbildung entfernt werden konnten. So konnte bei gleichzeitiger Berücksichtigung der im Modell verbliebenen Risikofaktoren kein signifikanter Einfluss für die folgenden Variablen nachgewiesen werden: Hauptstammstenose, instabile Angina, klinischer Schweregrad der Herzinsuffizienz: NYHA (III), Troponin positiv, Angina pectoris und vorausgegangene PCI. Die Variablen Fettstoffwechselstörung, arterielle Hypertonie und Nikotinabusus wurden bei der Entwicklung des KCH-SCORE im Jahr 2004 als Variablen ohne zusätzlichen Einfluss identifiziert und bei der Datensatzüberarbeitung 2007 aus dem Datensatz entfernt.

Die in Tabelle 1 näher definierten 17 Variablen konnten dagegen als Risikofaktoren mit gemeinsamem Einfluss auf die In-Hospital-Letalität identifiziert werden. In die Berechnung des Risikomodells gingen schließlich 43.145 von 45.514 Patienten mit isoliert koronarchirurgischer Erstoperation ein, die eine vollständige Dokumentation zu allen 17 im Modell verbliebenen Risikofaktoren aufwiesen, was eine Vollständigkeit an Datensätzen von 94,8% aus der ursprünglichen Grundgesamtheit bedeutet.

Zur Überprüfung der Modellgültigkeit wurde die Hosmer-Lemeshow-Goodness-of-Fit-Teststatistik verwendet. Dazu werden die für jeden Patienten aus dem Modell vorhergesagten Wahrscheinlichkeiten zu versterben aufsteigend sortiert und in zehn gleich große Gruppen aufgeteilt. Ob die vorhergesagte Anzahl von Todesfällen in den zehn Gruppen mit der tatsächlich zu beobachtenden Anzahl in den Gruppen übereinstimmt, wird schließlich mittels eines χ^2 -Tests überprüft. Ein p-Wert von 0,189 für den Hosmer-Lemeshow-Goodness-of-Fit-Test lässt dabei keine signifikanten Unterschiede erkennen. Das bedeutet, dass das neu entwickelte Risikoadjustierungsmodell die Wahrscheinlichkeit, nach einer koronarchirurgischen Operation zu versterben, gut vorhersagt. Der Wert der ROC-Kurve, der die Diskriminierungsfähigkeit zwischen richtigen und falschen Vorhersagen beschreiben soll, kann mit 0,826 für das berechnete Modell ebenfalls als gut bezeichnet werden.

Risikofaktor KCH-SCORE 3.0	Definition laut BQS-Datensatz Herzchirurgie
Alter (fünf Risikoklassen)	a) 66 - 70 Jahre b) 71 - 75 Jahre c) 76 - 80 Jahre d) 81 - 85 Jahre e) > 85 Jahre
Geschlecht	weiblich
Body Mass Index (BMI): (Körpergewicht bei Aufnahme / (Körpergröße / 100) ²) (zwei Risikoklassen)	a) BMI < 22 b) BMI > 35
Klinischer Schweregrad der Herzinsuffizienz	NYHA-Klassifikation (IV): Beschwerden in Ruhe
Myokardinfarkt	Infarkt(e) innerhalb der letzten 21 Tage
Kritischer präoperativer Status	kardiogener Schock/Dekompensation innerhalb der letzten 48 Stunden ODER Reanimation innerhalb der letzten 48 Stunden ODER Patient wird beatmet ODER Katecholamine (Inotrope (i. v.)) ODER IABP als (präoperative) mechanische Kreislaufunterstützung
Pulmonale Hypertonie	pulmonale Hypertonie
Herzrhythmus bei Aufnahme	Vorhofflimmern ODER andere Rhythmusstörungen
Linksventrikuläre Dysfunktion (zwei Risikoklassen)	a) LVEF mittel oder 30 - 50% b) LVEF schlecht oder < 30%
Koronarangiographiebefund	3-Gefäßerkrankung
Reoperation (Vor-OP Herz/Aorta)	Anzahl Voroperationen an Herz/Aorta \geq 1 ODER genaue Anzahl unbekannt (aber mind. 1)
Diabetes mellitus (insulinpflichtig)	Diabetes mellitus mit Insulin behandelt
Arterielle Gefäßerkrankung	arterielle Gefäßerkrankung
Lungenerkrankung(en) (zwei Risikoklassen)	a) COPD mit Dauermedikation ODER COPD ohne Dauermedikation b) andere Lungenerkrankungen
Neurologische Dysfunktion	neurologische Erkrankungen: ZNS, zerebrovaskulär (Blutung/Ischämie) ODER ZNS, andere (Parkinson, Alzheimer) ODER peripher ODER Kombination
Präoperative Nierenersatztherapie oder präoperativer Kreatininwert	akute präoperative Nierenersatztherapie ODER chronische präoperative Nierenersatztherapie ODER Kreatininwert (präoperativ) > 2,3 mg/dl ODER Kreatininwert (präoperativ) > 200 μ mol/l
Notfall	OP-Dringlichkeit Notfall ODER OP-Dringlichkeit Notfall (Reanimation/ultima ratio)

Tabelle 1: Risikofaktoren mit statistisch signifikantem Einfluss auf die In-Hospital-Letalität bei isoliert koronarchirurgischen Eingriffen.

Risikofaktor KCH-SCORE 3.0	Regressions- koeffizient	Standard- fehler	p-Wert	Odds-Ratio
Konstante	-5,874	0,111	<0,001	
Alter 66 - 70 Jahre	0,487	0,100	<0,001	1,63
Alter 71 - 75 Jahre	0,813	0,093	<0,001	2,26
Alter 76 - 80 Jahre	1,134	0,095	<0,001	3,11
Alter 81 - 85 Jahre	1,328	0,115	<0,001	3,77
Alter > 85 Jahre	1,502	0,206	<0,001	4,49
Geschlecht weiblich	0,186	0,069	0,007	1,20
Body Mass Index < 22	0,376	0,114	0,001	1,46
Body Mass Index > 35	0,453	0,111	<0,001	1,57
Herzinsuffizienz: NYHA (IV)	0,562	0,076	<0,001	1,75
Myokardinfarkt <= 21 Tage zurück	0,362	0,071	<0,001	1,44
Kritischer präoperativer Status	0,953	0,076	<0,001	2,59
Pulmonale Hypertonie	0,471	0,116	<0,001	1,60
Herzrhythmus: Vorhofflimmern oder andere Herzrhythmusstörungen	0,502	0,081	<0,001	1,65
LVEF mittel oder 30 - 50%	0,415	0,070	<0,001	1,51
LVEF schlecht oder < 30%	0,806	0,089	<0,001	2,24
3-Gefäßerkrankung	0,407	0,087	<0,001	1,50
Reoperation an Herz/Aorta	0,557	0,109	<0,001	1,74
Diabetes mellitus (insulinpflichtig)	0,217	0,077	0,005	1,24
Arterielle Gefäßerkrankung	0,398	0,066	<0,001	1,49
Lungenerkrankung: COPD	0,419	0,080	<0,001	1,52
Lungenerkrankung: andere	0,507	0,153	0,001	1,66
Neurologische Dysfunktion	0,325	0,091	<0,001	1,38
Nierenersatztherapie oder Kreatininwert	0,927	0,098	<0,001	2,53
Notfall	0,758	0,077	<0,001	2,13

Tabelle 2: Ergebnis der multiplen logistischen Regression für den KCH-SCORE 3.0 (isolierte Koronarchirurgie).

Das Ergebnis der multiplen logistischen Regression ist in Tabelle 2 dargestellt. Die Regressionskoeffizienten stellen dabei die in dem Modell berechneten Gewichtungen der einzelnen Risikofaktoren dar, mit dem Standardfehler als Maß der Variation. Aus beiden zusammen berechnen sich mittels Wald- χ^2 -Teststatistik die p-Werte. Mit dem Odds-Ratio, das ebenfalls aus den Regressionskoeffizienten berechnet wird, lässt sich schließlich aussagen, um welchen Faktor die einzelnen Risikofaktoren die Chance erhöhen, nach oder während eines koronarchirurgischen Eingriffs im Krankenhaus zu versterben. So ist die Chance zu versterben für Notfallpatienten 2,13-mal höher als für Nicht-Notfallpatienten, wenn ansonsten gleiche Risiken vorliegen. Da sich diese Interpretation auf die Chance (= Wahrscheinlichkeit im Krankenhaus zu versterben / Wahrscheinlichkeit im Krankenhaus nicht zu versterben) bezieht, werden zur Berechnung der vom Patientenrisiko abhängigen erwarteten Letalität die Regressionskoeffizienten verwendet.

Ausgehend vom logistischen Regressionsmodell

$$\ln \frac{p}{1-p} = \beta_0 + \beta_1 \cdot x_1 + \beta_2 \cdot x_2 + \dots + \beta_n \cdot x_n \quad (1)$$

mit den Risikofaktoren x_1, \dots, x_n (hier mit den Werten '1' bei Vorliegen und '0' bei Nicht-Vorliegen), der Konstanten β_0 und den Regressionskoeffizienten β_1, \dots, β_n lässt sich die Wahrscheinlichkeit p , nach einem isoliert vorgenommenen koronarchirurgischen Eingriff im Krankenhaus zu versterben, nun für jeden Patienten mit vollständigen Angaben zu den 17 Risikofaktoren unter Berücksichtigung seiner individuellen Risikostruktur berechnen:

$$p = \frac{\exp(\beta_0 + \beta_1 \cdot x_1 + \beta_2 \cdot x_2 + \dots + \beta_n \cdot x_n)}{1 + \exp(\beta_0 + \beta_1 \cdot x_1 + \beta_2 \cdot x_2 + \dots + \beta_n \cdot x_n)} \quad (2)$$

So beträgt die erwartete Wahrscheinlichkeit, nach einem vorgenommenen isoliert koronarchirurgischen Eingriff in einem deutschen Krankenhaus zu versterben, für eine 78-jährige weibliche Patientin mit arterieller Gefäßerkrankung, einer LVEF von 30 bis 50%, einer 3-Gefäßerkrankung als Koronarangiographiebefund und ohne weitere Risikofaktoren

$$p = \frac{\exp(-5,874 + 1,134 + 0,186 + 0,398 + 0,415 + 0,407)}{1 + \exp(-5,874 + 1,134 + 0,186 + 0,398 + 0,415 + 0,407)} = \frac{\exp(-3,334)}{1 + \exp(-3,334)}$$

$$= \frac{0,0357}{1,0357} = 0,034 = 3,4\%$$

Bei zusätzlichem Vorliegen einer COPD als Lungenerkrankung erhöht sich diese auf

$$p = \frac{\exp(-5,874 + 1,134 + 0,186 + 0,398 + 0,415 + 0,407 + 0,419)}{1 + \exp(-5,874 + 1,134 + 0,186 + 0,398 + 0,415 + 0,407 + 0,419)} = \frac{\exp(-2,915)}{1 + \exp(-2,915)}$$

$$= \frac{0,0542}{1,0542} = 0,051 = 5,1\%$$

Summiert man für ein Krankenhaus die erwarteten Versterbenswahrscheinlichkeiten aller Patienten mit isoliert koronarchirurgischen Eingriffen, so erhält man die zu erwartende Anzahl der im Krankenhaus verstorbenen Patienten. Berechnet man den Mittelwert, erhält man die aus dem Patientenmix resultierende erwartete In-Hospital-Letalitätsrate eines Krankenhauses.

Betrachtet man für das Auswertungsjahr 2008 bundesweit alle 43.145 Patienten mit vollständiger Dokumentation zum KCH-SCORE 3.0 und addiert alle erwarteten Versterbenswahrscheinlichkeiten auf, erhält man als Ergebnis 1.291 erwartete In-Hospital-Todesfälle bei 1.291 tatsächlich beobachteten. Die erwartete und beobachtete bundesweite Letalitätsrate für das Jahr 2008 beträgt entsprechend in beiden Fällen 3,0%. Für den EuroSCORE ergibt sich bei gleichem Vorgehen für die 43.578 Patienten mit vollständiger Dokumentation zum EuroSCORE eine erwartete Anzahl von bundesweit 3.240 Todesfällen bei tatsächlich beobachteten 1.317. Die mittels EuroSCORE vorhergesagte Letalitätsrate von 7,4% überschätzt die beobachtete In-Hospital-Letalitätsrate von 3,0% deutlich.

KCH-SCORE 3.0 Tabelle

Zur Abschätzung des Risikos eines Patienten mittels KCH-SCORE 3.0 kann auch die nebenstehende Tabelle verwendet werden. Dazu werden für alle bei einem Patienten auftretenden Risikofaktoren die Werte der in Tabelle 2 angegebenen Regressionskoeffizienten aufaddiert, um den entsprechenden Wert des KCH-SCORE 3.0 zu erhalten. Das prozentuale Risiko eines Patienten, nach einem isoliert vorgenommenen koronarchirurgischen Eingriff im Krankenhaus zu versterben, lässt sich dann in der Tabelle ablesen.

Betrachtet man wiederum eine 78-jährige weibliche Patientin mit arterieller Gefäßerkrankung, einer LVEF von 30 bis 50%, einer 3-Gefäßerkrankung und ohne weitere Risikofaktoren, so erhält man für den KCH-SCORE 3.0 einen Wert von 2,540 (=1,134+0,186+0,398+0,415+0,407). Für diese Patientin liegt das erwartete Risiko zu versterben zwischen 3,3% und 4,2%.

Bei zusätzlichem Vorliegen einer COPD erhöht sich der Wert des KCH-SCORE 3.0 um 0,419 auf 2,959. In der Tabelle lässt sich damit eine erwartete Letalität ablesen, die zwischen 4,2% und 5,3% liegt.

addierte KCH-Score 3.0 Werte (Patient)	erwartete Letalität (Patient)
0,00	0,3%
0,25	0,4%
0,50	0,5%
0,75	0,6%
1,00	0,8%
1,25	1,0%
1,50	1,2%
1,75	1,6%
2,00	2,0%
2,25	2,6%
2,50	3,3%
2,75	4,2%
3,00	5,3%
3,25	6,8%
3,50	8,5%
3,75	10,7%
4,00	13,3%
4,25	16,5%
4,50	20,2%
4,75	24,5%
5,00	29,4%
5,25	34,9%
5,50	40,8%
5,75	46,9%

3. Der AKL-SCORE (isolierte Aortenklappenchirurgie)

Entwicklung des logistischen Modells

Bei der Entwicklung des Modells für die isolierte Aortenklappenchirurgie wurde auf den Datenpool der BQS-Bundesauswertung 2008 zurückgegriffen, in dem 11.794 Patienten dokumentiert sind, bei denen in der ersten Operation während des stationären Aufenthaltes ein isolierter Eingriff an der Aortenklappe vorgenommen wurde. Insbesondere konnten auch die im Erfassungsjahr 2008 erstmalig dokumentationspflichtigen Leistungen transfemorale kathetergestützte Eingriffe an der Aortenklappe in die Modellbildung einbezogen werden. Dabei wurden folgende potenzielle Risikofaktoren auf einen gemeinsamen Einfluss auf die In-Hospital-Letalität bei isolierten Eingriffen an der Aortenklappe überprüft: Alter, Geschlecht, Body Mass Index, klinischer Schweregrad der Herzinsuffizienz (NYHA-Klassifikation), Angina pectoris (nach CCS), Myokardinfarkt, instabile Angina, kritischer präoperativer Status, pulmonale Hypertonie, Herzrhythmus bei Aufnahme, linksventrikuläre Dysfunktion, signifikante Hauptstammstenose, vorausgegangene PCI, Vor-OP an Herz/Aorta, präoperativer Kreatininwert oder Nierenersatztherapie, Diabetes mellitus (insulinpflichtig), floride Endokarditis, arterielle Gefäßerkrankung, Lungenerkrankung(en), neurologische Dysfunktion, Notfall.

Bei gleichzeitiger Berücksichtigung der im Modell verbliebenen Risikofaktoren wurde für die folgenden Risikofaktoren kein zusätzlicher signifikanter Einfluss nachgewiesen: Hauptstammstenose, instabile Angina, klinischer Schweregrad der Herzinsuffizienz: NYHA (III), Angina pectoris, vorausgegangene PCI, Diabetes mellitus (insulinpflichtig), andere Lungenerkrankungen als COPD und neurologische Dysfunktion. Diese blieben bei der endgültigen Modellberechnung daher unberücksichtigt.

Die in Tabelle 3 näher definierten 15 Variablen konnten dagegen als Risikofaktoren mit gemeinsamem Einfluss auf die In-Hospital-Letalität identifiziert werden. Die Altersklasse der 66 - 70jährigen wurde dagegen auch beibehalten, um sich auf dieselbe Referenzaltersgruppe (18 - 65 Jahre) wie in den anderen beiden Leistungsbereichen zu beziehen. In die Berechnung des Risikomodells gingen schließlich 11.147 von 11.794 Patienten mit isolierter Erstoperation an der Aortenklappe ein, die eine vollständige Dokumentation zu allen 15 im Modell verbliebenen Risikofaktoren aufwiesen, was eine Vollständigkeit an Datensätzen von 94,5% aus der ursprünglichen Grundgesamtheit bedeutet.

Risikofaktor AKL-SCORE	Definition laut BQS-Datensatz Herzchirurgie
Alter (fünf Risikoklassen)	a) 66 - 70 Jahre b) 71 - 75 Jahre c) 76 - 80 Jahre d) 81 - 85 Jahre e) > 85 Jahre
Geschlecht	weiblich
Body Mass Index (BMI): (Körpergewicht bei Aufnahme / (Körpergröße / 100) ²) (zwei Risikoklassen)	a) BMI < 22 b) BMI > 35
Klinischer Schweregrad der Herzinsuffizienz	NYHA-Klassifikation (IV): Beschwerden in Ruhe
Myokardinfarkt	Infarkt(e) innerhalb der letzten 21 Tage
Kritischer präoperativer Status	kardiogener Schock/Dekompensation innerhalb der letzten 48 Stunden ODER Reanimation innerhalb der letzten 48 Stunden ODER Patient wird beatmet ODER Katecholamine (Inotrope (i. v.)) ODER IABP als (präoperative) mechanische Kreislaufunterstützung
Pulmonale Hypertonie	pulmonale Hypertonie
Herzrhythmus bei Aufnahme	Vorhofflimmern ODER andere Rhythmusstörungen
Linksventrikuläre Dysfunktion (zwei Risikoklassen)	a) LVEF mittel oder 30 - 50% b) LVEF schlecht oder < 30%
Reoperation (Vor-OP Herz/Aorta)	Anzahl Voroperationen an Herz/Aorta \geq 1 ODER genaue Anzahl unbekannt (aber mind. 1)
Akute Infektion(en)	floride Endokarditis
Arterielle Gefäßerkrankung	arterielle Gefäßerkrankung
Lungenerkrankung(en)	COPD mit Dauermedikation ODER COPD ohne Dauermedikation
Präoperative Nierenersatztherapie oder präoperativer Kreatininwert	akute präoperative Nierenersatztherapie ODER chronische präoperative Nierenersatztherapie ODER Kreatininwert (präoperativ) > 2,3 mg/dl ODER Kreatininwert (präoperativ) > 200 μ mol/l
Notfall	OP-Dringlichkeit Notfall ODER OP-Dringlichkeit Notfall (Reanimation/ultima ratio)

Tabelle 3: Risikofaktoren für die In-Hospital-Letalität beim AKL-SCORE für isolierte Eingriffe an der Aortenklappe.

Zur Überprüfung der Modellgültigkeit wurde die Hosmer-Lemeshow-Goodness-of-Fit-Teststatistik verwendet. Ein p-Wert von 0,776 für den Hosmer-Lemeshow-Goodness-of-Fit-Test lässt dabei keine signifikanten Unterschiede erkennen. Das bedeutet, dass das neu entwickelte Risikoadjustierungsmodell die Wahrscheinlichkeit, nach einem isolierten Eingriff an der Aortenklappe zu versterben, gut vorhersagt. Der Wert der ROC-Kurve kann mit 0,808 für das berechnete Modell ebenfalls als gut bezeichnet werden.

Das Ergebnis der multiplen logistischen Regression ist in Tabelle 4 dargestellt. Mit dem Odds-Ratio, das aus den Regressionskoeffizienten berechnet wird, lässt sich aussagen, um welchen Faktor die einzelnen Risikofaktoren die Chance erhöhen, nach oder während eines isolierten Eingriffs an der Aortenklappe im Krankenhaus zu versterben. So ist die Chance zu versterben für Notfallpatienten 2,88-mal höher als für Nicht-Notfallpatienten, wenn ansonsten gleiche Risiken vorliegen. Da sich diese Interpretation auf die Chance (= Wahrscheinlichkeit im Krankenhaus zu versterben / Wahrscheinlichkeit im Krankenhaus nicht zu versterben) bezieht, werden zur Berechnung der vom Patientenrisiko abhängigen erwarteten Letalität die Regressionskoeffizienten verwendet. Die Berechnung erfolgt dabei analog zum Vorgehen beim KCH-SCORE 3.0 für die isolierte Koronarchirurgie.

Risikofaktor AKL-SCORE	Regressions- koeffizient	Standard- fehler	p-Wert	Odds-Ratio
Konstante	-5,504	0,204	<0,001	
Alter 66 - 70 Jahre	0,461	0,248	0,063	1,58
Alter 71 - 75 Jahre	0,909	0,218	<0,001	2,48
Alter 76 - 80 Jahre	1,292	0,211	<0,001	3,64
Alter 81 - 85 Jahre	1,782	0,216	<0,001	5,94
Alter > 85 Jahre	2,351	0,239	<0,001	10,50
Geschlecht weiblich	0,357	0,114	0,002	1,43
Body Mass Index < 22	0,359	0,154	0,019	1,43
Body Mass Index > 35	0,393	0,192	0,041	1,48
Herzinsuffizienz: NYHA (IV)	0,532	0,142	<0,001	1,70
Myokardinfarkt <= 21 Tage zurück	0,825	0,277	0,003	2,28
Kritischer präoperativer Status	0,662	0,158	<0,001	1,94
Pulmonale Hypertonie	0,398	0,126	0,002	1,49
Herzrhythmus: Vorhofflimmern oder andere Herzrhythmusstörungen	0,343	0,119	0,004	1,41
LVEF mittel oder 30 - 50%	0,283	0,119	0,018	1,33
LVEF schlecht oder < 30%	0,570	0,169	0,001	1,77
Reoperation an Herz/Aorta	0,307	0,143	0,032	1,36
Fluide Endokarditis	0,545	0,213	0,010	1,72
Arterielle Gefäßerkrankung	0,359	0,125	0,004	1,43
Lungenerkrankung: COPD	0,318	0,135	0,018	1,37
Nierenersatztherapie oder Kreatininwert	1,164	0,153	<0,001	3,20
Notfall	1,057	0,195	<0,001	2,88

Tabelle 4: Ergebnis der multiplen logistischen Regression für den AKL-SCORE (isolierte Aortenklappenchirurgie).

AKL-SCORE Tabelle

Zur Abschätzung des Risikos eines Patienten mittels AKL-SCORE kann auch die nebenstehende Tabelle verwendet werden. Dazu werden für alle bei einem Patienten auftretenden Risikofaktoren die Werte der in Tabelle 4 angegebenen Regressionskoeffizienten aufaddiert, um den entsprechenden Wert des AKL-SCORE zu erhalten. Das prozentuale Risiko eines Patienten, nach einem isoliert vorgenommenen Eingriff an der Aortenklappe im Krankenhaus zu versterben, lässt sich dann in der Tabelle ablesen.

Betrachtet man eine 78-jährige weibliche Patientin mit arterieller Gefäßerkrankung, einer LVEF von 30 bis 50% und ohne weitere Risikofaktoren, so erhält man für den AKL-SCORE einen Wert von 2,291 (= 1,292 + 0,357 + 0,359 + 0,283). Für diese Patientin liegt das erwartete Risiko zu versterben zwischen 3,7% und 4,7%.

Bei zusätzlichem Vorliegen einer COPD erhöht sich der Wert des AKL-SCORE um 0,318 auf 2,609. In der Tabelle lässt sich damit eine erwartete Letalität ablesen, die zwischen 4,7% und 6,0% liegt.

addierte AKL-SCORE Werte (Patient)	erwartete Letalität (Patient)
0,00	0,4%
0,25	0,5%
0,50	0,7%
0,75	0,9%
1,00	1,1%
1,25	1,4%
1,50	1,8%
1,75	2,3%
2,00	2,9%
2,25	3,7%
2,50	4,7%
2,75	6,0%
3,00	7,6%
3,25	9,5%
3,50	11,9%
3,75	14,7%
4,00	18,2%
4,25	22,2%
4,50	26,8%
4,75	32,0%
5,00	37,7%
5,25	43,7%
5,50	49,9%
5,75	56,1%

4. Der KBA-SCORE (kombinierte Bypass- und Aortenklappenchirurgie)

Entwicklung des logistischen Modells

Bei der Entwicklung des Modells für die kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie wurde auf den Datenpool der BQS-Bundesauswertung 2008 zurückgegriffen, in dem 7.700 Patienten dokumentiert sind, die in ihrer ersten Operation kombiniert koronarchirurgisch und an der Aortenklappe operiert wurden. Es wurden folgende potenzielle Risikofaktoren auf einen gemeinsamen Einfluss auf die In-Hospital-Letalität bei kombinierter Bypass- und Aortenklappenchirurgie überprüft: Alter, Geschlecht, Body Mass Index, klinischer Schweregrad der Herzinsuffizienz (NYHA-Klassifikation), Angina pectoris (nach CCS), Myokardinfarkt, instabile Angina, kritischer präoperativer Status, pulmonale Hypertonie, Herzrhythmus bei Aufnahme, linksventrikuläre Dysfunktion, 3-Gefäßerkrankung, signifikante Hauptstammstenose, vorausgegangene PCI, Vor-OP an Herz/Aorta, präoperativer Kreatininwert oder Nierenersatztherapie, Diabetes mellitus (insulinpflichtig), floride Endokarditis, arterielle Gefäßerkrankung, Lungenerkrankung(en), neurologische Dysfunktion, Notfall.

Bei gleichzeitiger Berücksichtigung der im Modell verbliebenen Risikofaktoren wurde für die folgenden Risikofaktoren kein zusätzlicher signifikanter Einfluss nachgewiesen: Hauptstammstenose, instabile Angina, pulmonale Hypertonie, klinischer Schweregrad der Herzinsuffizienz: NYHA (III), Angina pectoris, Body Mass Index > 35, 3-Gefäßerkrankung, vorausgegangene PCI, arterielle Gefäßerkrankung, andere Lungenerkrankungen als COPD und neurologische Dysfunktion. Diese blieben bei der endgültigen Modellberechnung daher unberücksichtigt.

Die in Tabelle 5 näher definierten 14 Variablen wurden als Risikofaktoren mit gemeinsamem Einfluss auf die In-Hospital-Letalität identifiziert. In die Berechnung des Risikomodells gingen schließlich 7.310 von 7.700 Patienten mit kombinierter Erstoperation an den Koronarien und der Aortenklappe ein, die eine vollständige Dokumentation zu allen 14 im Modell verbliebenen Risikofaktoren aufwiesen, was eine Vollständigkeit an Datensätzen von 94,9% aus der ursprünglichen Grundgesamtheit bedeutet.

Risikofaktor KBA-SCORE	Definition laut BQS-Datensatz Herzchirurgie
Alter (fünf Risikoklassen)	a) 66 - 70 Jahre b) 71 - 75 Jahre c) 76 - 80 Jahre d) 81 - 85 Jahre e) > 85 Jahre
Geschlecht	weiblich
Body Mass Index (BMI): (Körpergewicht bei Aufnahme / (Körpergröße / 100) ²)	BMI < 22
Klinischer Schweregrad der Herzinsuffizienz	NYHA-Klassifikation (IV): Beschwerden in Ruhe
Myokardinfarkt	Infarkt(e) innerhalb der letzten 21 Tage
Kritischer präoperativer Status	kardiogener Schock/Dekompensation innerhalb der letzten 48 Stunden ODER Reanimation innerhalb der letzten 48 Stunden ODER Patient wird beatmet ODER Katecholamine (Inotrope (i. v.)) ODER IABP als (präoperative) mechanische Kreislaufunterstützung
Herzrhythmus bei Aufnahme	Vorhofflimmern ODER andere Rhythmusstörungen
Linksventrikuläre Dysfunktion (zwei Risikoklassen)	a) LVEF mittel oder 30 - 50% b) LVEF schlecht oder < 30%
Reoperation (Vor-OP Herz/Aorta)	Anzahl Voroperationen an Herz/Aorta \geq 1 ODER genaue Anzahl unbekannt (aber mind. 1)
Akute Infektion(en)	floride Endokarditis
Diabetes mellitus (insulinpflichtig)	Diabetes mellitus mit Insulin behandelt
Lungenerkrankung(en)	COPD mit Dauermedikation ODER COPD ohne Dauermedikation
Präoperative Nierenersatztherapie oder präoperativer Kreatininwert	akute präoperative Nierenersatztherapie ODER chronische präoperative Nierenersatztherapie ODER Kreatininwert (präoperativ) > 2,3 mg/dl ODER Kreatininwert (präoperativ) > 200 μ mol/l
Notfall	OP-Dringlichkeit Notfall ODER OP-Dringlichkeit Notfall (Reanimation/ultima ratio)

Tabelle 5: Risikofaktoren für die In-Hospital-Letalität beim KBA-SCORE für die kombinierte Bypass- und Aortenklappenchirurgie.

Zur Überprüfung der Modellgültigkeit wurde die Hosmer-Lemeshow-Goodness-of-Fit-Teststatistik verwendet. Ein p-Wert von 0,318 für den Hosmer-Lemeshow-Goodness-of-Fit-Test lässt dabei keine signifikanten Unterschiede erkennen. Das bedeutet, dass das neu entwickelte Risikoadjustierungsmodell die Wahrscheinlichkeit, nach einer kombinierten Bypass- und Aortenklappenoperation zu versterben, gut vorhersagt. Der Wert der ROC-Kurve kann mit 0,745 für das berechnete Modell ebenfalls als hinreichend gut bezeichnet werden.

Das Ergebnis der multiplen logistischen Regression ist in Tabelle 6 dargestellt. Mit dem Odds-Ratio, das aus den Regressionskoeffizienten berechnet wird, lässt sich aussagen, um welchen Faktor die einzelnen Risikofaktoren die Chance erhöhen, nach oder während eines kombinierten Eingriffs an den Koronarien und der Aortenklappe im Krankenhaus zu versterben. So ist die Chance zu versterben für Notfallpatienten 2,16-mal höher als für Nicht-Notfallpatienten, wenn ansonsten gleiche Risiken vorliegen. Da sich diese Interpretation auf die Chance (= Wahrscheinlichkeit im Krankenhaus zu versterben / Wahrscheinlichkeit im Krankenhaus nicht zu versterben) bezieht, werden zur Berechnung der vom Patientenrisiko abhängigen erwarteten Letalität die Regressionskoeffizienten verwendet. Die Berechnung erfolgt dabei analog zum Vorgehen beim KCH-SCORE 3.0 für die isolierte Koronarchirurgie.

Risikofaktor KBA-SCORE	Regressions- koeffizient	Standard- fehler	p-Wert	Odds-Ratio
Konstante	-4,739	0,237	<0,001	
Alter 66 - 70 Jahre	0,674	0,261	0,010	1,96
Alter 71 - 75 Jahre	0,905	0,242	<0,001	2,47
Alter 76 - 80 Jahre	1,061	0,240	<0,001	2,89
Alter 81 - 85 Jahre	1,268	0,248	<0,001	3,55
Alter > 85 Jahre	1,356	0,319	<0,001	3,88
Geschlecht weiblich	0,525	0,111	<0,001	1,69
Body Mass Index < 22	0,396	0,181	0,029	1,49
Herzinsuffizienz: NYHA (IV)	0,416	0,152	0,006	1,52
Myokardinfarkt <= 21 Tage zurück	0,467	0,166	0,005	1,60
Kritischer präoperativer Status	0,589	0,152	<0,001	1,80
Herzrhythmus: Vorhofflimmern oder andere Herzrhythmusstörungen	0,290	0,127	0,023	1,34
LVEF mittel oder 30 - 50%	0,301	0,118	0,011	1,35
LVEF schlecht oder < 30%	0,941	0,162	<0,001	2,56
Reoperation an Herz/Aorta	0,784	0,163	<0,001	2,19
Fluide Endokarditis	0,707	0,350	0,043	2,03
Diabetes mellitus (insulinpflichtig)	0,317	0,136	0,020	1,37
Lungenerkrankung: COPD	0,324	0,138	0,019	1,38
Nierenersatztherapie oder Kreatininwert	0,925	0,167	<0,001	2,52
Notfall	0,771	0,188	<0,001	2,16

Tabelle 6: Ergebnis der multiplen logistischen Regression für den KBA-SCORE
(kombinierte Bypass- und Aortenklappenchirurgie).

KBA-SCORE Tabelle

Zur Abschätzung des Risikos eines Patienten mittels KBA-SCORE kann auch die nebenstehende Tabelle verwendet werden. Dazu werden für alle bei einem Patienten auftretenden Risikofaktoren die Werte der in Tabelle 6 angegebenen Regressionskoeffizienten aufaddiert, um den entsprechenden Wert des KBA-SCORE zu erhalten. Das prozentuale Risiko eines Patienten, nach einem kombinierten Eingriff an den Koronarien und der Aortenklappe im Krankenhaus zu versterben, lässt sich dann in der Tabelle ablesen.

Betrachtet man eine 78-jährige weibliche Patientin mit einer LVEF von 30 bis 50% und ohne weitere Risikofaktoren, so erhält man für den KBA-SCORE einen Wert von 1,887 (= 1,061 + 0,525 + 0,301). Für diese Patientin liegt das erwartete Risiko zu versterben zwischen 4,8% und 6,1%.

Bei zusätzlichem Vorliegen einer COPD erhöht sich der Wert des KBA-SCORE um 0,324 auf 2,211. In der Tabelle lässt sich damit eine erwartete Letalität ablesen, die zwischen 6,1% und 7,7% liegt.

addierte KBA-SCORE Werte (Patient)	erwartete Letalität (Patient)
0,00	0,9%
0,25	1,1%
0,50	1,4%
0,75	1,8%
1,00	2,3%
1,25	3,0%
1,50	3,8%
1,75	4,8%
2,00	6,1%
2,25	7,7%
2,50	9,6%
2,75	12,0%
3,00	14,9%
3,25	18,4%
3,50	22,5%
3,75	27,1%
4,00	32,3%
4,25	38,0%
4,50	44,1%
4,75	50,3%
5,00	56,5%

5. Risikoadjustierung mit dem logistischen Regressionsmodell

Bei der Risikoadjustierung mit dem logistischen Regressionsmodell wird die tatsächlich beobachtete In-Hospital-Letalitätsrate eines Krankenhauses (O für **O**bserved) mit der erwarteten In-Hospital-Letalitätsrate (E für **E**xpected) verglichen. Grundgesamtheit sind alle Patienten eines Leistungsbereichs mit vollständiger Dokumentation zum jeweils verwendeten logistischen Regressionsmodell.

Die beobachtete In-Hospital-Letalitätsrate O eines Krankenhauses berechnet sich als Anzahl der im Krankenhaus verstorbenen Patienten geteilt durch die Anzahl behandelter Patienten.

Die nach der Risikostruktur seiner Patienten zu erwartende In-Hospital-Letalitätsrate E eines Krankenhauses für die isolierte Koronarchirurgie berechnet man, indem zunächst für alle behandelten Patienten eines Krankenhauses die nach dem logistischen KCH-SCORE 3.0 erwarteten Versterbenswahrscheinlichkeiten summiert werden (= erwartete Anzahl von im Krankenhaus verstorbenen Patienten) und diese dann ebenfalls durch die Anzahl der Patienten teilt. Durch dieses Vorgehen werden die bei jedem Patienten beobachteten Risikofaktoren mit berücksichtigt, und man erhält eine erwartete Letalitätsrate, die den jeweiligen Patientenmix eines Krankenhauses mit einbezieht. So liegt für ein Krankenhaus mit überdurchschnittlich vielen Hoch-Risiko-Patienten die erwartete Letalitätsrate E über der im Jahre 2008 bundesweit beobachteten Letalitätsrate von 3,0%. Die erwartete In-Hospital-Letalitätsrate E für die isolierte Aortenklappenchirurgie bzw. die kombinierte Koronar- und Aortenklappenchirurgie erhält man entsprechend mittels Verwendung des logistischen AKL-SCORE bzw. KBA-SCORE.

Als Gesamtletalitätsraten bezeichnet man nun die bundesweit beobachteten und erwarteten In-Hospital-Letalitätsraten. Die Berechnung erfolgt analog zur Berechnung der beobachteten und erwarteten In-Hospital-Letalitätsraten der einzelnen Krankenhäuser, mit dem Unterschied, dass hier z.B. alle isoliert koronarchirurgisch behandelten Patienten mit vollständiger Dokumentation zum KCH-SCORE 3.0 aus allen teilnehmenden herzchirurgischen Abteilungen betrachtet werden. Für das Jahr 2008 beträgt die bundesweit beobachtete Gesamtletalitätsrate 3,0% (1.291 In-Hospital verstorbenen Patienten / 43.145 behandelte Patienten).

Für einen risikoadjustierten Vergleich der Krankenhäuser wird im Weiteren der Unterschied zwischen O und E betrachtet. Der Unterschied lässt sich einerseits über die Differenz $O - E$ oder das Verhältnis O / E darstellen.

Die Differenz $O - E$ ist der Anteil Todesfälle, der über dem erwarteten Anteil liegt. Sie kann aufgefasst werden als absolute Abweichung der beobachteten Letalität von der erwarteten Letalität. Beträgt zum Beispiel für ein Krankenhaus der nach Patientenmix erwartete Anteil von Todesfällen $E = 3,5\%$, wird aber tatsächlich eine Letalitätsrate von $O = 4,5\%$ beobachtet, ist das Ergebnis um 1,0 Prozentpunkte schlechter als nach der Risikostruktur der Patienten zu erwarten gewesen wäre. Wird eine Letalitätsrate von $O = 2,6\%$ beobachtet, ist das Ergebnis des Krankenhauses um 0,9 Prozentpunkte besser als nach dem Patientenmix erwartet.

Über das Verhältnis O / E lässt sich erkennen, wie groß die Abweichung ist, wenn man sie in Bezug zu der erwarteten Letalität setzt. Beträgt zum Beispiel $E = 3,5\%$ und sei $O = 4,5\%$, so ist das Ergebnis des Krankenhauses um das 1,29-fache (bzw. um 29%) schlechter als nach dem Patientenmix zu erwarten gewesen wäre. Wird stattdessen eine Letalitätsrate von $O = 2,6\%$ beobachtet, beträgt das Krankenhausergebnis dagegen das 0,74-fache des erwarteten Wertes von $E = 3,5\%$. Das Ergebnis wäre 26% besser als nach der Risikostruktur der Patienten zu erwarten gewesen wäre.

Über die so genannte „risikoadjustierte In-Hospital-Letalität“ ($= (O / E) * \text{Gesamtletalität}$) kann sich das Krankenhaus schließlich mit der Gesamt-In-Hospital-Letalitätsrate aller teilnehmenden herzchirurgischen Krankenhäuser vergleichen. Diese Methode, die auch vom New York State Department of Health (1996) eingesetzt wird, hat den Vorteil, dass für alle teilnehmenden Krankenhäuser die risikoadjustierten Letalitätsraten berechnet werden, die erreicht würden, wenn alle Krankenhäuser dieselben Patientenrisiken hätten. Damit werden alle Krankenhausergebnisse direkt miteinander vergleichbar. Im Ergebnis wird für jedes Krankenhaus die Letalitätsrate so berechnet, als wenn es z.B. bezüglich aller 17 Risikofaktoren des KCH-SCORES 3.0 einen Patientenmix gehabt hätte, der identisch zum im Jahre 2008 bundesweit in der Grundgesamtheit beobachteten Patientenmix ist.

Sei beispielsweise die erwartete In-Hospital-Letalitätsrate eines Krankenhauses $E = 3,7\%$ und die tatsächlich beobachtete In-Hospital-Letalitätsrate dieses Krankenhauses $O = 3,3\%$. Die Gesamtleitungsrate für das Jahr 2008 beträgt $3,0\%$. In dem Wert von $E = 3,7\%$ drückt sich dabei schon aus, dass ein entsprechendes Krankenhaus A mehr Hoch-Risiko-Patienten behandelt, als im Durchschnitt zu erwarten gewesen wäre. Um einen Vergleich mit den anderen Krankenhäusern zu ermöglichen, wird die risikoadjustierte Rate berechnet. So ergibt sich die risikoadjustierte In-Hospital-Letalität zu $(3,3\% / 3,7\%) * 3,0\% = 2,7\%$. Anstelle der beobachteten $3,3\%$ In-Hospital-Letalität ergäbe sich hier für das Krankenhaus A eine risikoadjustierte In-Hospital-Letalitätsrate von $2,7\%$. Dies ist das Krankenhausergebnis, das erzielt worden wäre, wenn es den identischen Patientenmix zur Grundgesamtheit aller teilnehmenden Krankenhäuser gehabt hätte.

Betrachtet man ein zweites Krankenhaus B mit $E = 2,6\%$ und $O = 2,5\%$, so berechnet sich die risikoadjustierte In-Hospital-Letalität zu $(2,5\% / 2,6\%) * 3,0\% = 2,9\%$. Da die Patienten dieses Krankenhauses geringere Risiken in sich tragen als im Durchschnitt zu erwarten gewesen wäre, steigt die risikoadjustierte Rate gegenüber der beobachteten von $2,5\%$ auf $2,9\%$ an. Bei gleichem Patientenmix, wie er in der Grundgesamtheit aller teilnehmenden Krankenhäuser vorliegt, hätte Krankenhaus B ein Krankenhausergebnis von $2,9\%$ erzielt.

Ein Vergleich von Krankenhaus A mit Krankenhaus B zeigt schließlich: Betrachtet man nur die rohen In-Hospital-Letalitätsraten würde Krankenhaus A mit einer Rate von $3,3\%$ schlechter dastehen als Krankenhaus B mit $2,5\%$. In Krankenhaus A werden jedoch mehr Hoch-Risiko-Patienten behandelt als in Krankenhaus B. Soll dieses berücksichtigt werden, dann gibt die risikoadjustierte Rate Auskunft darüber, wie sich die Ergebnisse darstellen würden, wenn beide Krankenhäuser einen identischen Patientenmix gehabt hätten. Dabei wird ersichtlich, dass - wenn beide Krankenhäuser gleiche Patientenrisiken gehabt hätten - Krankenhaus A ein besseres Ergebnis von $2,7\%$ erzielt hätte als Krankenhaus B mit $2,9\%$.

6. Literaturverzeichnis

BQS Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung gGmbH. Risikoadjustierung in der Herzchirurgie. in: Mohr VD, Bauer J, Döbler K, Fischer B, Woldenga C, (Hrsg.). Qualität sichtbar machen. BQS-Qualitätsreport 2002. Düsseldorf: BQS Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung gGmbH; 2003. 26-29.

BQS Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung gGmbH. Neue Risikoadjustierung in der Koronarchirurgie: der KCH-Score. in: Mohr VD, Bauer J, Döbler K, Eckert O, Fischer B, Woldenga C, (Hrsg.). Qualität sichtbar machen. BQS-Qualitätsreport 2004. Düsseldorf: BQS Bundesgeschäftsstelle Qualitätssicherung gGmbH; 2005; 46-49.

Michel P, Roques F, Nashef SAM. Logistic or additive EuroSCORE for high-risk patients? European Journal of Cardio-thoracic Surgery 2003; 23: 684-687.

New York State Department of Health. Coronary Artery Bypass Surgery in New York State 1992 - 1994. New York State Department of Health; 1996. <http://www.health.state.ny.us> (Recherchedatum: 15.05.2008)

New York State Department of Health. Adult Cardiac Surgery in New York State 2003 - 2005. New York State Department of Health; 2008. <http://www.health.state.ny.us> (Recherchedatum: 15.05.2008)

Roques F, Nashef SAM, Michel P, Gauducheau E, de Vincentiis C, Baudet E, Cortina J, David M, Faichney A, Gabrielle F, Gams E, Harjula A, Jones MT, Pinna Pintor P, Salamon R, Thulin L. Risk factors and outcome in European cardiac surgery: analysis of the EuroSCORE multinational database of 19030 patients. European Journal of Cardio-thoracic Surgery 1999; 15: 816-823.